

# 1. Submit , 11 Oktober 2019

JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN Tasks 0 English View Site sudika

111 / Sudika et al. / Kajian Perubahan Ragam Genetik Tanaman Jagung (Zea mays L.) akibat Seleksi Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

### Submission Files [Search](#)

 279-1	<a href="#">admin, ARTIKEL UNTUK JSTL.doc</a>	October 11, 2019	Article Text
---	---	------------------	--------------

[Download All Files](#)

### Pre-Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

w

KAJIAN PERUBAHAN RAGAM GENETIK AKIBAT  
SELEKSI PADA  
TANAMAN JAGUNG (*Zea mays* L.)  
*Study of Genetic Variation Change As a Result of Selection on Maize*  
(*Zea mays* L.)

Penulis:

Dr. Ir. I Wayan Sudika, MS. \*)

(Dosen pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unram, HP:  
081917160095)

Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutresna, MP

Dosen pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unram, HP:  
08123994404)

Ir. Dwi Ratna Anugrahwati, M.Sc. Ph.D

(Dosen pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unram, HP.:  
081805215124)

\*)Koresponden: email: [sudikawayanms@gmail.com](mailto:sudikawayanms@gmail.com).

→ persiapan artikel sesuai format JSTL.  
→ lihat template - author guide. !!!

→ ~~dan~~ judul :

Kajian Perubahan Ragam Genetik  
Tanaman Jagung akibat seleksi.

→ Dpt diterbitkan pd JSTL, setelah  
perbaikan atas koreksi dan saran. !!

KAJIAN PERUBAHAN RAGAM GENETIK AKIBAT SELEKSI PADA  
TANAMAN JAGUNG (*Zea mays* L.)  
*Study of Genetic Variation Change As a Result of Selection on Maize (Zea mays L.)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ragam genetik total setelah dilakukan delapan siklus seleksi massa dengan teknik indeks seleksi untuk daya hasil, berangkasan segar, dan bobot tongkol kering panen tanaman jagung dan untuk mengetahui rata-rata ketiga karakter tersebut dibandingkan dengan populasi awal. Percobaan dilaksanakan di kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 11 perlakuan, yaitu delapan populasi hasil seleksi, populasi awal dan dua varietas hibrida. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga diperoleh 33 unit percobaan. Data hasil percobaan dianalisa dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 persen. Ragam fenotip diperoleh dari ragam sampel; sedangkan ragam lingkungan merupakan rata-rata ragam fenotip dua hibrida. Ragam genetik diperoleh dari ragam fenotip masing-masing populasi dikurangi ragam lingkungan. Guna mengetahui ragam genetik populasi siklus kedelapan sama atau berbeda dengan populasi awal, maka dilakukan uji- $F_{0.05}$ . Rata-rata antar populasi awal dengan populasi siklus kedelapan, diuji dengan uji  $BNT_{0.05}$ . Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ragam genetik total populasi hasil seleksi siklus kedelapan untuk daya hasil, bobot tongkol kering panen dan berangkasan segar lebih kecil dibanding ragam genetik populasi awal. Rata-rata daya hasil, bobot tongkol kering panen dan berangkasan segar populasi hasil seleksi siklus delapan lebih tinggi dibanding populasi awal.

**ABSTRACT**

This study aimed to determine the change in total genetic diversity after eight cycles of mass selection using a technique of selection index for yield, fresh dry matter, and weight of dry

harvested cob, and to find out the average of these three characters compared to the initial population. This experiment was carried out at Pringgabaya District, East Lombok Regency using Randomized Block Design (RBD) with 11 treatments, namely eight selected populations, initial populations and two hybrid varieties. Each treatment was replicated 3 times, resulted in 33 experimental units. Data obtained were analyzed using analysis of variance at 0.05 levels. Variance of phenotype is obtained from the variety of samples; while the environmental variance is defined as the average variance of the two hybrid phenotypes. Genetic diversity is obtained from the variety of phenotypes of each population minus the environmental diversity. F-test of 0.05 was performed to find out whether the genetic diversity of the eighth cycle population is the same or different to that of the genetic diversity of the initial population. The average between the initial population and the eighth cycle population was tested using the HSD-test at 0.05 levels. The results showed that the total genetic variation in the population from the eighth cycle selection for yield, harvested dry weight of cobs, and fresh dry matter of maize were smaller than the genetic diversity of the initial population. The average yield, harvested dry cob weight and fresh dry matter weight of population of the eighth cycle selection are higher than the initial population.

Kata kunci: Seleksi massa, indeks seleksi, daya hasil dan brangkasan segar

Keywords: Mass selection, selection index, yield, fresh dry matter.

... lagi !!  
 sebanyak lima kali  
 waei !!

## PENDAHULUAN

Karakter daya hasil dan brangkasan segar tanaman jagung telah diperbaiki menggunakan metode seleksi massa dengan seleksi indeks selama delapan siklus di lahan kering. Seleksi massa adalah seleksi yang digunakan untuk mengembangkan varietas dengan berbagai genotipe; yang populasi dasarnya mempunyai keragaman genetik tinggi. Seleksi massa merupakan salah satu

seleksi berulang. Menurut Syukur (2012), bahwa seleksi massa akan berhasil apabila ditujukan untuk memperbaiki karakter yang memiliki heritabilitas tinggi. Andriani *et al.*, 2015) menambahkan, bahwa perbaikan genetik suatu populasi akan berhasil apabila dalam populasi tersebut terdapat variabilitas genetik tinggi. Besar kecilnya peningkatan rerata populasi setiap siklus, digambarkan dari rata-rata kemajuan seleksi per siklus. Menurut Anonim<sup>us</sup> (2012), bahwa prediksi kemajuan seleksi yang diperoleh, memerlukan pengetahuan tentang nilai keragaman genetik, ragam fenotipe, intensitas seleksi dan koefisien seleksi.

Seleksi terhadap dua sifat atau lebih dapat dilakukan secara tandem, *independent culling level* dan seleksi indeks. Seleksi indeks memberikan informasi dari semua sifat ke dalam suatu indeks, dengan demikian memungkinkan memberi skor total pada setiap individu. Metode ini dilakukan terhadap beberapa sifat secara simultan dan pertimbangan-pertimbangan lain yang dipakai pemulia tanaman hanya berdasar bobot nisbi yang diberikan terhadap masing-masing sifat (Soemartono<sup>s</sup> *et al.* 1992). Sudika, *et al* (2018) telah melakukan seleksi indeks dan mengujinya hingga siklus ketujuh. Rata-rata kemajuan seleksi per siklus daya hasil (berat biji kering pipil per plot) sebesar 72,80 g/plot bersifat linear yang nyata dan untuk bobot brangkasan segar per tanaman sebesar 11,50 g juga bersifat linear yang nyata. Menurut Nasrullah (1994), bahwa seleksi menyebabkan perubahan rerata dan ragam populasi. Ragam populasi terdiri atas ragam genetik, ragam lingkungan dan ragam interaksi genetik dengan lingkungan (Wardyn<sup>us</sup> *et al.*, 2007).

Peningkatan rata-rata populasi akibat seleksi massa diikuti pula oleh penurunan ragam genetik karena semakin seragamnya tanaman terpilih. Disisi lain, dalam setiap siklus seleksi, selalu dilakukan rekombinasi genetik untuk mempertahankan keragaman genetik, sehingga seleksi dapat dilakukan pada siklus berikutnya. Selain itu, besarnya intensitas seleksi sangat

menentukan besarnya peningkatan rerata dan penurunan ragam genetik sifat yang diseleksi pada seleksi berulang, seperti seleksi massa (Peter dan Lamkey , 2000). Sudika (1992), telah melakukan penelitian tentang perubahan genetik akibat seleksi massa pada tanaman jagung manis. Hasil yang diperoleh, bahwa ragam genetik berubah setelah dilakukan dua siklus seleksi massa. Dalam penelitian ini dilakukan seleksi massa dengan menggunakan indeks seleksi hingga siklus kedelapan guna peningkatan daya hasil dan brangkasan segar, namun belum diketahui perubahan ragam genetik dan peningkatan sifat tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perubahan ragam genetik total setelah dilakukan delapan siklus seleksi massa dengan menggunakan indeks seleksi untuk daya hasil, berangkasan segar, dan bobot tongkol kering panen tanaman jagung dan untuk mengetahui rata-rata populasi hasil seleksi ketiga karakter tersebut dibandingkan dengan populasi awal.

## BAHAN DAN METODE

Percobaan telah dilaksanakan di Desa Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur pada tanah bertekstur geluh. Kegiatan dimulai bulan April sampai dengan bulan Agustus 2019.

### Bahan

Bahan yang digunakan meliputi benih jagung hibrida Bisi 2 dan NK212, populasi awal (Po), populasi hasil seleksi siklus pertama hingga siklus kedelapan dan varietas hibrida Bisi-2 dan NK212, pupuk Phonska, pupuk Urea, Calaris, Furadan 3G, dan Saromyl 35 SD, Prevaton dan Alike. Formulasi?

Rancangan percobaan

cara menyajikan

lihat template dan author guide !!!

Percobaan dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan 11 perlakuan (populasi) dan diulang sebanyak 3 kali. Adapun perlakuan meliputi: P0 = Populasi awal (hasil rakitan kultivar lokal); P1 hingga P8 berturut-turut merupakan populasi hasil seleksi massa dengan indeks seleksi siklus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan, varietas hibrida NK212 dan hibrida Bisi-2.

### Pelaksanaan

Sebelum ditanam, benih diperlakukan dengan Saromyl 35 SD dengan dosis 5 g per kg benih untuk mencegah penyakit bulai (*Seclerospora maydis*).

Pengolahan tanah dilakukan dengan membajak dan menggaru masing-masing sebanyak satu kali, kemudian tanah diratakan dengan cangkul. Selanjutnya petak percobaan, dibagi menjadi 3 blok dengan jarak antar blok 1 m. Antar blok dipisahkan dengan pematang untuk memudahkan pengairan.

Penanaman dilakukan dengan cara menugal tanah kurang lebih sedalam 5 cm dan setiap lubang diisi dua biji benih. Jarak tanam yang digunakan adalah 20 x 60 cm. Pada setiap lubang tanam, diberikan Furadan 3G untuk mencegah serangan hama, kemudian lubang ditutup dengan tanah. Di antara barisan tanaman pada setiap perlakuan ditanami pula beberapa lubang untuk bahan penyulaman. Setiap perlakuan, ditanam 5 baris dan masing-masing beris berisi 20 tanaman, jumlah tanaman setiap perlakuan maksimal sebanyak 100 tanaman.

Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali, secara bertahap dengan menggunakan pupuk Phonska dan pupuk Urea. Dosis untuk pupuk Phonska sebanyak 300 kg/ha dan pupuk urea sebanyak 200 kg/ha yang diberikan dua kali. Pemberian pupuk dilakukan dengan cara 300 kg/ha Phonska bersamaan dengan 100 kg/ha Urea; yang diberikan pada saat tanam. Pemupukan kedua dilakukan setelah tanaman berumur 21 hari menggunakan pupuk Urea dengan dosis 100 kg/ha.

Cara penulisan lihat  
afflor garde !!  
(template) !!

Pemupukan dilakukan dengan menugal sebelah kiri atau kanan lubang tanam dengan jarak sekitar 10 cm dari lubang tanam.

Penyulaman dilakukan pada umur tanaman 10 hari setelah tanam. Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang mati atau tidak tumbuh, dengan menggunakan tanaman cadangan. Tanaman yang mati/tidak tumbuh diganti dengan cara membuat lubang pada tempat yang akan disulam, kemudian tanaman cadangan diangkat dengan tanahnya kemudian dimasukkan ke lubang yang telah dibuat sebelumnya.

Penjarangan dilakukan pada umur 14 hari setelah tanam, dengan mencabut salah satu tanaman yang pertumbuhannya lebih jelek pada setiap lubang.

Penyiangan dilakukan dengan menyemprotkan herbisida Calaris pada umur 17 hari setelah tanam. Pembumbunan dilakukan pada umur 25 hari setelah tanam dengan cara mencangkul tanah di antara barisan tanaman. Tanah tersebut ditimbunkan ke kiri dan ke kanan, sehingga nampak seperti guludan pada setiap baris.

Pengairan dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian dengan selang waktu 10 hari hingga umur 70 hari setelah tanam. Pengairan dilakukan dengan cara leeb, yakni petakan digenangi hingga permukaan air rata dengan permukaan tanah.

Pengendalian hama penggerak bunga jantan, dilakukan dengan menyemprotkan larutan Alika dicampur dengan Prevaton pada umur 38 hari. Dosis yang digunakan adalah 400 liter per hektar.

Panen dilakukan pada saat tanaman sudah memenuhi kriteria panen yaitu rambut tongkol telah kering, biji keras, kelobot telah berwarna kuning dan kering, serta biji mengkilap dan apabila dipijit tidak berbekas.

### Variabel dan analisis data

Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun total per tanaman, jumlah daun segar saat panen, diameter tongkol, panjang tongkol, bobot tongkol kering panen per tanaman, bobot brangkasan segar per tanaman dan bobot biji kering pipil per tanaman.

Ragam genetik total diperoleh dengan menggunakan analisis statistik sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung ragam fenotipe setiap perlakuan dengan rumus:

$$\sigma^2 P_j = \frac{(\sum x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- 2) Pendugaan ragam lingkungan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$\sigma^2 E = \frac{(\sigma^2 P_{Bisi 2} + \sigma^2 P_{NK212})}{2}$$

- 3) Menghitung ragam genetik total setiap perlakuan dengan rumus:

$$\sigma^2 G_j = \sigma^2 P_j - \sigma^2 E$$

dengan j bergerak dari 0 sampai 8.

- 4). Perbedaan ragam genetik total populasi siklus 8 diuji dengan uji-F pada taraf nyata 5 persen sebagai berikut:

$$F_{hit} = \frac{\sigma^2 G_{P0}}{\sigma^2 G_{P8}}; \text{ kemudian dibandingkan dengan } F_{0.05}$$

Guna menentukan perbedaan daya hasil dan sifat lain antar perlakuan, maka dilakukan analisis ragam dan selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan Uji beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata lima persen. *cara penulisan ?!*

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data tentang ragam fenotip sifat yang diamati untuk setiap populasi disajikan pada Tabel 1 dan ragam genetik totalnya, disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

**Letakan Tabel 1 disini**

Keragaman sifat dalam suatu populasi disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan, yang besarnya diukur dan dinyatakan sebagai varian. Keragaman genetik merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan genotipe dalam populasi. Keragaman fenotip yang terjadi merupakan akibat adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan (Basuki, 2005). Ragam fenotip pada Tabel 1, ini digunakan untuk menghitung besarnya ragam genetik total setiap sifat yang diamati pada setiap siklus seleksi. Nilai rata-rata ragam fenotip hibrida Bisi-2 dan NK212 merupakan penduga untuk ragam lingkungan. Oleh karena itu, ragam genetik total diperoleh dari pengurangan ragam fenotip setiap sifat dengan rata-rata ragam fenotip dua hibrida. Seluruh sifat yang diamati, memiliki ragam fenotip yang lebih besar dibanding rata-rata ragam fenotip dua hibrida. Hal ini ini dapat terjadi karena hibrida merupakan F1; yang tersusun dari genotip seragam (CKB Maize, 2007); sedangkan populasi hasil seleksi merupakan komposit; yang terdiri atas berbagai genotip (Mejaya *et al.*, 2010). Akibatnya, penampilan tanaman di lapangan akan lebih seragam pada populasi hibrida dibanding populasi setiap siklus (Kutka, 2011) .

**Letakan Tabel 2 disini.****Letakan Tabel 3 disini**

Pada Tabel 2 dan Tabel 3 terlihat, bahwa ragam genetik total populasi siklus ketujuh dan kedelapan lebih kecil dibanding ragam genetik total populasi awal untuk seluruh sifat yang diamati, kecuali bobot biji kering pipil per tanaman, hanya populasi siklus kedelapan yang lebih kecil. Ragam genetik total mulai populasi siklus ketiga jumlah daun total per tanaman dan bobot brangkasan segar per tanaman lebih kecil dibanding populasi awal. Hal ini menunjukkan, bahwa rekombinasi genetik tidak mampu mempertahankan keragaman sejak siklus ketiga. Selain itu

mungkin pula disebabkan oleh jumlah tanaman terpilih lima persen yang kurang besar. Jumlah tanaman terpilih menentukan nilai intensitas seleksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Peter dan Lamkey (2000), bahwa intensitas seleksi turut pula berperan dalam mempertahankan keragaman genetik pada populasi berulang.

Sifat yang diseleksi adalah bobot tongkol kering panen dan bobot berangkasan segar, sedangkan sifat yang diperbaiki adalah bobot biji kering pipil dan bobot berangkasan segar. Berdasarkan Tabel 2, ragam genetik sifat yang diseleksi pada bobot tongkol kering panen berubah secara nyata pada populasi P7IS dan P8IS; sedangkan pada bobot berangkasan segar menunjukkan ragam genetik yang berubah secara nyata pada populasi P3IS, P5IS, P6IS, P7IS, dan P8IS. Ragam genetik pada daya hasil atau bobot biji kering pipil berubah secara nyata pada populasi P8IS. Perubahan ragam genotip total secara nyata menunjukkan bahwa nilai ragam populasi suatu siklus tidak sama dengan populasi awal (P0). Ragam genetik pada P8IS lebih kecil dibanding dengan P0. Hal ini disebabkan oleh proses seleksi yang telah dilakukan selama 8 siklus. Semakin banyak siklus seleksi, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan rerata yang umumnya semakin meningkat. Peningkatan rerata akan diikuti oleh pengurangan ragam genetik pada populasi yang diseleksi. Berkurangnya ragam genetik total disebabkan oleh dalam melakukan seleksi, dipilih tanaman-tanaman yang bobot tongkol dan bobot brangkasan segar lebih tinggi sebanyak 5%, sehingga didalam populasi hasil seleksi akan menjadi lebih seragam. Hal ini sesuai dengan pendapat Soemartono, *et al.* (1992) dan Basuki (2005), bahwa seleksi menyebabkan perubahan frekuensi gen dan frekuensi genotip yang dapat dilihat dari perubahan rerata dan perubahan ragam populasi.

Persentase penurunan ragam genetik total sifat yang diseleksi dan sifat yang diperbaiki berbeda seperti terlihat pada Gambar 1. Persentase penurunan paling tinggi, yakni 99,75 persen

terjadi pada bobot brangkasan segar per tanaman, kemudian diikuti oleh bobot tongkol kering panen per tanaman sebesar 84,99 persen dan penurunan paling kecil terjadi pada bobot biji kering pipil per tanaman (daya hasil), yakni sebesar 42,51 persen. Hal ini dapat terjadi karena bobot brangkasan segar per tanaman merupakan sifat yang diseleksi sekaligus sifat yang diperbaiki. Daya hasil merupakan sifat yang diperbaiki melalui bobot tongkol kering panen per tanaman, sehingga penurunan ragam genetiknya paling kecil.

### **Letakan Gambar 1 disini.**

Setiap siklus seleksi dilakukan rekombinasi genetik guna mempertahankan ragam genetik. Penurunan ragam genetik secara nyata mengindikasikan bahwa rekombinasi genetik yang dilakukan tidak mampu mempertahankan keragaman genetik atau rekombinasi genetik tidak efektif. Sifat bobot tongkol kering panen menunjukkan bahwa pada populasi siklus ke-7 dan ke-8 terjadi penurunan nilai ragam genetik yang besar; berarti rekombinasi genetik mampu mempertahankan keragaman genetik populasi hingga siklus keenam; namun untuk brangkasan segar per tanaman efektif hingga siklus kedua. Penurunan ragam genetik secara nyata terjadi pada siklus kedelapan; berarti rekombinasi genetik efektif hingga siklus ketujuh Peter dan Lamkey (2000) memperoleh, bahwa ragam genetik daya hasil jagung tidak berubah setelah dilakukan lima siklus seleksi. Hasil penelitian Sudika (1992), bahwa ragam genetik aditif hasil berubah setelah dua siklus seleksi massa untuk tongkol layak jual pada tanaman jagung manis.

Seleksi massa dengan indeks seleksi menyebabkan perubahan rerata populasi pada setiap siklus seleksi, seperti terlihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. Pada Tabel 4 terlihat, bahwa jumlah daun segar saat panen dan bobot brangkasan segar lebih besar dibanding populasi awal mulai siklus pertama; namun tinggi tanaman mulai siklus kedua. Jumlah daun total per tanaman tidak mengalami peningkatan akibat delapan siklus seleksi.

**Letakan Tabel 4 disini**

**Letakan Tabel 5 disini**

Pada Tabel 5 terlihat pula, bahwa diameter tongkol lebih besar sejak siklus siklus pertama; panjang tongkol dan bobot tongkol kering panen per tanaman sejak siklus kelima dan untuk daya hasil (bobot biji kering pipil per tanaman) lebih tinggi dibanding populasi awal sejak siklus keenam. Nilai koefisien korelasi fenotipik antara daya hasil dengan sifat lain disajikan pada Tabel 6.

**Letakan Tabel 6 disini**

Pada Tabel 6 terlihat, seluruh sifat yang diamati memiliki nilai koefisien korelasi positif nyata dengan daya hasil; namun besarnya berlainan. Jumlah daun total per tanaman dan jumlah daun segar saat panen per tanaman memiliki nilai koefisien korelasi  $< 0,50$  dan sifat lain  $> 0,50$ .

Rata-rata daya hasil lebih tinggi dibanding populasi awal sejak siklus keenam; bahkan oleh Aini (2018), membuktikan daya hasil tersebut lebih tinggi sejak siklus kelima. Peningkatan rerata terjadi karena setiap siklus seleksi terjadi peningkatan frekuensi gen dan frekuensi genotip daya hasil. Beberapa sifat meningkat secara nyata sejak siklus pertama dan ada juga yang meningkat sejak siklus kedua. Hal ini dapat terjadi karena setiap sifat disusun oleh jumlah lokus yang berlainan, sehingga perubahan frekuensi gen dan fekuensi genotipenya berlainan. Lokus-lokus penyusun setiap sifat dalam kromosom dapat terjadi tautan dan keamatan tautan tersebut dapat dilihat dari korelasinya. Rata-rata daya hasil lebih tinggi pada P8IS terjadi karena tanaman lebih tinggi (Tabel 4), ukuran tongkol lebih besar dan lebih panjang serta bobot tongkol lebih tinggi (Tabel 5). Nilai koefisien korelasi sifat-sifat tersebut juga mendukung, yakni korelasinya positif nyata. Tanaman yang tinggi akan memiliki kemampuan menangkap cahaya matahari lebih banyak, sehingga fotosintat yang dihasilkan lebih banyak. Fotosintat yang banyak mampu diterima oleh *sink* tanaman sehingga akan menyebabkan komponen hasil dan hasil yang lebih

tinggi. Hal sama diperoleh oleh Subaedah, *et al.* (2016) dan Silva *et al.* (2004), bahwa daya hasil semakin tinggi akibat tongkol semakin panjang dan oleh Abdalla, *et al.* (2010), daya hasil memiliki koefisien korelasi positif nyata dengan bobot tongkol kering panen. Nilai koefisien korelasi daya hasil dengan panjang tongkol dan bobot tongkol kering panen berturut-turut 0,70 an 0,85 (Tabel 6).

### KESIMPULAN DAN SARAN

- Ragam genetik total daya hasil, bobot tongkol kering panen, dan berangkasan segar populasi siklus delapan hasil seleksi massa menggunakan indeks seleksi lebih kecil dibanding populasi awal.
- Rata-rata daya hasil, bobot tongkol kering panen, dan berangkasan segar populasi hasil seleksi siklus delapan lebih tinggi dibanding populasi awal.
- Sebaiknya tidak dilakukan seleksi lagi, namun perlu adanya upaya untuk meningkatkan keragaman genetik khususnya untuk sifat yang diseleksi dan sifat yang diperbaiki, yaitu bobot tongkol kering panen, bobot berangkasan segar, dan bobot biji kering pipil (daya hasil).

### DAFTAR PUSTAKA

- ✓ Abdalla, A., M. F. Mahmoud, A. M. El. Naim. 2010. Evaluation of Some Maize (*Zea mays* L.) Varieties in Different Environments of The Nuba Mountain, Sudan. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4 (12): 6605 – 6610.
- ✓ Aini, H. 2018. Uji Daya Hasil Tanaman Jagung Hasil Seleksi Indeks Di Lahan Kering (Skripsi). Fakultas Pertanian Unram. Mataram.
- ✓ Andriani, Suwarni W.B. Sutjahjo S.H. 2015. Pendugaan Keragaman Genetik dan Heritabilitas Jagung Hibrida Silang Puncak pada Perlakuan Cekaman kekeringan. *Informatika Pertanian*. 24: 91-100.
- ✓ Anonymus. 2012. Metode Seleksi Indeks. <http://ptitb.wordpress.com/category/06-seleksi-berdasarkan-karakter-kriteria-seleksi/62-seleksi-langsung/>. [Diakses November 2018].
- ✓ Bastuki, N. 2005. Genetika Kuantitatif. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. \* tua
- ✓ CKB Maize. 2007. What Is Hybrid Maize ?. <http://www.knowledgebank.irri.org/ckb/quality> \* (Diakses, 23 Januari 2014).
- ✓ Kutka, F. 2011. Open-Pollinated vs Hybrid Maize Cultivars. Sustainability, 3 (9): 1531 – 1554.

8 parental  
17 Postabun

kurang < 50%

syarat DSTL minimal 60%  
jasaal dari referensi  
diquakan !!!

minimal 100 referensi  
(paling tua) 2009. (10thn)

Referensi

Bonahan paregraf yg berisikan ke fya point ini => buat dlm bentuk paragraf !!!

- ✓ Mejaya, M. J., Azrai, R. N. Iriany. 2010. Pembentukan Varietas Unggul Jagung Bersari Bebas. Hal. 55 - 73. *Dalam Jagung: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Jakarta.
- ✓ Nasrullah. 1994. *Agriculture - Short Course Plant Breeding*. Vol. 2. Universitas Mataram, Lombok Indonesia. 124 p.
- ✓ Peter S. G. & K. R. Lamkey. 2000. Effective Population Size and Genetic Variability in the BS11 Maize Population. *Crop Sci.* (40):338-346.
- ✓ Soemartono, Nasrullah, Hari Hartika. 1992. *Genetika Kuantitatif Dan Bioteknologi Tanaman*. PAU Bioteknologi UGM. Yogyakarta 371h.
- ✓ Silva, A.R., C.L. Souza Jr., A.M. Aguiar, A.P. de Souza. 2004. Estimates of Genetic Variance and Level of Dominance in a Tropical Maize Population. I. Grain Yield and Plant Traits. *Maydica*, 49: 65 - 71.
- ✓ Subaedah, St., A. Takdir, Netty, D. Hidrawati. 2016. Evaluation of Potential Production of Maize Genotypes of Early Maturity in Rainfed Lowland. *International of Agricultural and Biosystems Engineering*. Vol. 10 (10): 638 - 641.
- ✓ Sudika, I W. 1992. Perubahan Komponen Varian Genetik Akibat Dua Siklus Seleksi Massa pada Tanaman Jagung Manis (*Zea mays saccharata* Sturt) (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 51 h.
- ✓ Sudika I.W., Parwata A.I.G.M. & Soemeinaboedhy S.I.N, 2018. Respon Seleksi Massa Secara Tidak Langsung Terhadap Daya Hasil Tanaman Jagung Selama Tujuh Siklus di Lahan kering. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*. 2: 144-152
- ✓ Syukur M., S. Sujiprihati, R. Yunianti. 2012. *Teknik Pemuliaan Tanaman*. Penebar Swadaya, Jakarta
- ✓ Wardyn, B.M., J.W. Edwards, K.R. Lamkey. 2007. The Genetic Structure of a Maize Population: The Role of Dominance. *Crop Sci.* 47: 467 - 476. doi:10.2135/cropsci.2006.05.0294.

Tabel 1. Ragam fenotip setiap populasi untuk setiap sifat yang diamati

mengapa bisa gunakan "populasi" ??

Perlakuan	Ragam fenotip							
	1	2	3	4	5	6	7	8
P0	1.338,69	2,30	3,49	0,22	7,71	1986,72	7132,79	589,33
P1IS	1.221,65	2,08	2,98	0,23	7,18	1704,17	7515,72	573,32
P2IS	1.210,34	2,27	2,96	0,20	6,87	1714,58	6214,79	555,65
P3IS	1.207,38	1,98	2,85	0,19	7,42	1750,96	5523,66	575,28
P4IS	1.293,42	1,98	2,44	0,19	7,45	1742,16	5806,43	563,16
P5IS	1.216,46	2,14	2,42	0,20	7,08	1685,78	5257,51	518,55
P6IS	1.128,09	2,01	2,71	0,16	5,62	1523,28	4678,26	519,99
P7IS	960,92	2,01	2,46	0,10	4,83	1294,54	4369,38	549,34
P8IS	993,98	2,04	2,39	0,09	4,80	828,76	4155,62	448,56
Bisi-2	527,77	1,91	1,58	0,05	2,61	585,90	3950,48	255,06
NK212	465,86	1,31	1,65	0,04	1,77	662,70	4345,97	261,18
Rata-rata 2 Hibrida	496,81	1,61	1,61	0,04	2,19	624,30	4148,23	258,12

lihat author guide:

bukan (koma) tetapi gunakan • (titik)!!!

Keterangan: 1. Tinggi tanaman (cm), 2. jumlah daun total (helai), 3. jumlah daun segar (helai), 4. diameter tongkol (cm), 5. panjang tongkol (cm), 6. bobot tongkol kering panen per tanaman (g), 7. bobot brangkasan segar per tanaman (g) dan 8. bobot biji kering pipil per tanaman (g).

Tabel 2. Ragam genetik total setiap populasi untuk tinggi tanaman, jumlah daun total, jumlah daun segar saat panen dan bobot brangkasan segar per tanaman


Perlakuan	Sifat yang diamati							
	1		2		3		4	
	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$
P0	841,88 a		0,69 a		1,88 a		2984,56 a	
P1IS	724,84 a	117,04	0,47 a	0,22	1,37 a	0,51	3367,49 a	382,93
P2IS	713,53 a	128,35	0,66 a	0,03	1,35 a	0,53	2066,56 a	918,00
P3IS	710,57 a	131,31	0,37 b	0,32	1,24 a	0,64	1375,43 b	1609,13
P4IS	796,61 a	45,27	0,37 b	0,32	0,83 b	1,05	1658,20 b	326,36
P5IS	719,65 a	122,23	0,53 b	0,16	0,81 b	1,07	1109,28 b	1875,28
P6IS	631,28 a	210,60	0,40 b	0,29	1,10 b	0,79	530,03 b	2454,53
P7IS	464,11 b	377,77	0,40 b	0,29	0,85 b	1,03	221,15 b	2763,41
P8IS	497,17 b	344,71	0,43 b	0,26	0,78 b	1,10	7,39 b	2977,17

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan P0 pada uji-F<sub>0,05</sub>,  $\sigma^2 G$ : ragam genetik,  $\Delta\sigma^2 G$ : perubahan ragam genetik, 1. tinggi tanaman (cm), 2. jumlah daun total per tanaman (helai), 3. jumlah daun segar per tanaman saat panen (helai) dan 4. bobot brangkasan segar per tanaman.

Tabel 3. Ragam genetik total komponen hasil dan hasil tanaman jagung

Perlakuan	Sifat yang diamati							
	1		2		3		4	
	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$
P0	0,18 a		5,52 a		1362,42 a		331,21 a	
P1IS	0,19 a	0,01	4,99 a	0,53	1079,87 a	282,55	315,20 a	16,01
P2IS	0,16 a	0,02	4,68 a	0,84	1090,28 a	272,14	297,53 a	33,68
P3IS	0,15 a	0,03	5,23 a	0,29	1126,66 a	235,76	317,16 a	14,04
P4IS	0,15 a	0,03	5,26 a	0,26	1117,86 a	244,55	305,04 a	26,17
P5IS	0,16 a	0,02	4,89 a	0,63	1061,48 a	300,94	260,43 a	70,77
P6IS	0,12 a	0,06	3,43 b	2,09	898,98 a	463,44	261,87 a	69,34
P7IS	0,06 b	0,12	2,64 b	2,88	670,24 b	692,18	291,22 a	39,98
P8IS	0,05 b	0,13	2,61 b	2,91	204,46 b	1157,95	190,44 b	140,77

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap P0 pada uji-F<sub>0,05</sub>,  $\sigma^2 G$ : ragam genetik,  $\Delta\sigma^2 G$ : perubahan ragam genetik, 1. diameter tongkol (cm), 2. panjang tongkol (cm), 3. bobot tongkol kering panen per tanaman (g) dan 4. Bobot biji kering pipil per tanaman (g).



Gambar 1. Persentase penurunan ragam genetik total tiga sifat tanaman jagung

Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun total, jumlah daun segar saat panen dan bobot brangkasan segar per tanaman setiap perlakuan

Perlakuan	Sifat-sifat yang diamati			
	1	2	3	4
P0	179,52 a	10,85	6,00 a	219,58 a
P1IS	182,54 a	10,95	6,85 b	284,86 b
P2IS	198,74 b	11,00	6,77 b	275,22 b
P3IS	194,11 b	10,92	7,00 b	281,94 b
P4IS	194,01 b	10,42	7,00 b	279,45 b
P5IS	193,36 b	11,12	7,13 b	330,88 b
P6IS	205,94 b	10,92	6,80 b	340,61 b
P7IS	206,47 b	11,40	7,25 b	346,62 b
P8IS	209,65 b	11,40	7,32 b	351,47 b
BNT <sub>0,05</sub>	10,89		0,54	43,65

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan P0 pada uji BNT<sub>0,05</sub>, 1. tinggi tanaman (cm), 2. jumlah daun total per tanaman (helai), 3. jumlah daun segar per tanaman saat panen (helai) dan 4. bobot brangkasan segar per tanaman (g).

Tabel 5. Rata-rata sifat komponen hasil dan hasil tanaman jagung setiap perlakuan

Perlakuan	Sifat sifat yang diamati			
	1	2	3	4
P0	4,01 a	10,48 a	103,18 a	57,21 a
P1IS	4,16 b	11,07 a	114,82 a	58,80 a
P2IS	4,21 b	11,62 a	118,17 a	62,44 a
P3IS	4,12 b	11,63 a	117,97 a	59,69 a

P4IS	4,16 b	11,91 a	118,51 a	62,66 a
P5IS	4,20 b	12,32 b	121,38 b	65,06 a
P6IS	4,30 b	12,57 b	127,78 b	70,54 b
P7IS	4,37 b	12,73 b	130,08 b	75,83 b
P8IS	4,43 b	13,10 b	137,41 b	81,28 b
BNT <sub>0,05</sub>	0,13	1,54	17,82	9,58

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan P0 pada uji BNT<sub>0,05</sub>, 1. diameter tongkol (cm), 2. panjang tongkol (cm), 3. bobot tongkol kering panen per tanaman (g) dan 4. Bobot biji kering pipil per tanaman (g).

Tabel 6 Nilai koefisien korelasi antar sifat dengan daya hasil (bobot biji kering pipil Per tanaman)

No	Sifat yang Diamati	Koefisien korelasi dengan daya hasil
1	Tinggi tanaman	0,70 s
2	Jumlah daun	0,43 s
3	Jumlah daun segar	0,49 s
4	Bobot berangkasan segar	0,63 s
5	Diameter tongkol	0,87 s
6	Panjang tongkol	0,70 s
7	Bobot tongkol kering panen	0,85 s

**Kajian Perubahan Ragam Genetik Tanaman Jagung (*Zea  
mays* L.) akibat Seleksi**

*Study of Genetic Variation Change on Maize (*Zea mays* L.)*

*As a Result of Selection*

Penulis:

I Wayan Sudika<sup>1\*</sup>, I Wayan Sutresna<sup>2</sup> dan Dwi Ratna Anugrahwati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian  
Universitas Mataram.

\*) Koresponden Author: email: [sudikawayanms@gmail.com](mailto:sudikawayanms@gmail.com). HP. 081917160095

**Kajian Perubahan Ragam Genetik Tanaman Jagung (*Zea  
mays* L.) akibat Seleksi**

*Study of Genetic Variation Change on Maize (*Zea mays* L.)*

*As a Result of Selection*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ragam genetik total setelah dilakukan delapan siklus seleksi massa dengan teknik indeks seleksi untuk daya hasil, berangkasan segar, dan bobot tongkol kering panen tanaman jagung dan untuk mengetahui rata-rata ketiga karakter tersebut dibandingkan dengan populasi awal. Percobaan dilaksanakan di kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak

Kelompok (RAK) 11 perlakuan, yaitu delapan populasi hasil seleksi, populasi awal dan dua varietas hibrida. Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga diperoleh 33 unit percobaan. Data hasil percobaan dianalisa dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 persen. Ragam fenotip diperoleh dari ragam sampel; sedangkan ragam lingkungan merupakan rata-rata ragam fenotip dua hibrida. Ragam genetik diperoleh dari ragam fenotip masing-masing populasi dikurangi ragam lingkungan. Guna mengetahui ragam genetik populasi siklus kedelapan sama atau berbeda dengan populasi awal, maka dilakukan uji- $F_{0.05}$ . Rata-rata antar populasi awal dengan populasi siklus kedelapan, diuji dengan uji  $BNT_{0.05}$ . Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ragam genetik total populasi hasil seleksi siklus kedelapan untuk daya hasil, bobot tongkol kering panen dan berangkasan segar lebih kecil dibanding ragam genetik populasi awal. Rata-rata daya hasil, bobot tongkol kering panen dan berangkasan segar populasi hasil seleksi siklus delapan lebih tinggi dibanding populasi awal.

#### **ABSTRACT**

This study aimed to determine the change in total genetic diversity after eight cycles of mass selection using a technique of selection index for yield, fresh dry matter, and weight of dry harvested cob, and to find out the average of these three characters compared to the initial population. This experiment was carried out at Pringgabaya District, East Lombok Regency using Randomized Block Design (RBD) with 11 treatments, namely eight selected populations, initial populations and two hybrid varieties. Each treatment was replicated 3 times, resulted in 33 experimental units. Data obtained were analyzed using analysis of variance at 0.05 levels. Variance of phenotype is obtained from the variety of samples; while the environmental variance is defined as the average variance of the two hybrid phenotypes. Genetic diversity is obtained from the variety of phenotypes of each population minus the environmental diversity. F-test of

0.05 was performed to find out whether the genetic diversity of the eighth cycle population is the same or different to that of the genetic diversity of the initial population. The average between the initial population and the eighth cycle population was tested using the HSD-test at 0.05 levels. The results showed that the total genetic variation in the population from the eighth cycle selection for yield, harvested dry weight of cobs, and fresh dry matter of maize were smaller than the genetic diversity of the initial population. The average yield, harvested dry cob weight and fresh dry matter weight of population of the eighth cycle selection are higher than the initial population.

Kata kunci: Brangkas, hibrida, hasil, indeks dan massa

*Keywords: Matter, hybrid, yield, index and mass.*

## PENDAHULUAN

Karakter daya hasil dan brangkas segar tanaman jagung telah diperbaiki menggunakan metode seleksi massa dengan seleksi indeks selama delapan siklus di lahan kering. Seleksi massa adalah seleksi yang digunakan untuk mengembangkan varietas dengan berbagai genotipe; yang populasi dasarnya mempunyai keragaman genetik tinggi. Seleksi massa merupakan salah satu seleksi berulang. Menurut Syukur (2012), bahwa seleksi massa akan berhasil apabila ditujukan untuk memperbaiki karakter yang memiliki heritabilitas tinggi. Andriani *et al.* (2015) menambahkan, bahwa perbaikan genetik suatu populasi akan berhasil apabila dalam populasi tersebut terdapat variabilitas genetik tinggi. Besar kecilnya peningkatan rerata populasi setiap siklus, digambarkan dari rata-rata kemajuan seleksi per siklus. Prediksi kemajuan seleksi yang diperoleh, memerlukan pengetahuan tentang nilai keragaman genetik, ragam fenotipe, intensitas seleksi dan koefisien seleksi (Metode Seleksi Indeks, 2012).

Seleksi terhadap dua sifat atau lebih dapat dilakukan secara tandem, *independent culling level* dan seleksi indeks. Seleksi indeks memberikan informasi dari semua sifat ke dalam suatu indeks, dengan demikian memungkinkan memberi skor total pada setiap individu. Metode ini dilakukan terhadap beberapa sifat secara simultan dan pertimbangan-pertimbangan lain yang dipakai pemulia tanaman hanya berdasar bobot nisbi yang diberikan terhadap masing-masing sifat. Menurut Asghar dan Mehdi (2010), bahwa seleksi indeks dasar untuk beberapa sifat akan lebih efektif dibanding seleksi indeks Smith-Hazel. Sudika *et al.* (2018) telah melakukan seleksi indeks dasar dan mengujinya hingga siklus ketujuh. Rata-rata kemajuan seleksi per siklus daya hasil (berat biji kering pipil per plot) sebesar  $72.80 \text{ gplot}^{-1}$  bersifat linear yang nyata dan untuk bobot brangkasan segar per tanaman sebesar  $11.50 \text{ gplot}^{-1}$  juga bersifat linear yang nyata. Seleksi menyebabkan perubahan rerata dan ragam populasi. Ragam populasi terdiri atas ragam genetik, ragam lingkungan dan ragam interaksi genetik dengan lingkungan (Andriani *et al.*, 2015)

Peningkatan rata-rata populasi akibat seleksi massa diikuti pula oleh penurunan ragam genetik karena semakin seragamnya tanaman terpilih. Disisi lain, dalam setiap siklus seleksi, selalu dilakukan rekombinasi genetik untuk mempertahankan keragaman genetik, sehingga seleksi dapat dilakukan pada siklus berikutnya. Selain itu, besarnya intensitas seleksi sangat menentukan besarnya peningkatan rerata dan penurunan ragam genetik sifat yang diseleksi pada seleksi berulang, seperti seleksi massa (Peter dan Lamkey , 2000). Dalam penelitian ini dilakukan seleksi massa dengan menggunakan indeks seleksi hingga siklus ke delapan guna peningkatan daya hasil dan brangkasan segar, namun belum diketahui perubahan ragam genetik dan peningkatan sifat tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perubahan ragam genetik total setelah dilakukan delapan siklus seleksi massa dengan menggunakan indeks seleksi

untuk daya hasil, berangkasan segar, dan bobot tongkol kering panen tanaman jagung dan untuk mengetahui rata-rata populasi hasil seleksi ketiga karakter tersebut dibandingkan dengan populasi awal.

## **BAHAN DAN METODE**

Percobaan telah dilaksanakan di Desa Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur pada tanah bertekstur geluh. Kegiatan dimulai bulan April sampai dengan bulan Agustus 2019.

### ***Bahan***

Bahan yang digunakan meliputi benih jagung hibrida Bisi 2 dan NK212, populasi awal (Po), populasi hasil seleksi siklus pertama hingga siklus kedelapan dan varietas hibrida Bisi-2 dan NK212, pupuk NPK Phonska (15-15-15), pupuk Urea, Calaris 550 SC, Furadan 3G, dan Saromyl 35 SD, Prevaton 50 SC dan Alika 247 ZC.

### ***Rancangan percobaan***

Percobaan dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 11 perlakuan (populasi) dan diulang sebanyak 3 kali. Adapun perlakuan meliputi: P0 = Populasi awal (hasil rakitan kultivar lokal); P1 hingga P8 berturut-turut merupakan populasi hasil seleksi massa dengan indeks seleksi siklus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan, varietas hibrida NK212 dan hibrida Bisi-2.

### ***Pelaksanaan***

Sebelum ditanam, benih diperlakukan dengan Saromyl 35 SD dengan dosis  $5 \text{ gkg}^{-1}$  benih untuk mencegah penyakit bulai (*Seclerospora maydis*).

Pengolahan tanah dilakukan dengan membajak dan menggaru masing-masing sebanyak satu kali, kemudian tanah diratakan dengan cangkul. Selanjutnya petak percobaan, dibagi menjadi 3 blok dengan jarak antar blok 1 m. Antar blok dipisahkan dengan pematang untuk memudahkan pengairan.

Penanaman dilakukan dengan cara menugal tanah kurang lebih sedalam 5 cm dan setiap lubang diisi dua biji benih. Jarak tanam yang digunakan adalah 20 x 60 cm. Pada setiap lubang tanam, diberikan Furadan 3G untuk mencegah serangan hama, kemudian lubang ditutup dengan tanah. Setiap perlakuan, ditanam 5 baris dan masing-masing baris berisi 20 tanaman, sehingga jumlah tanaman setiap perlakuan maksimal sebanyak 100 tanaman.

Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali, secara bertahap dengan menggunakan pupuk NPK Phonska (15-15-15) dan pupuk Urea. Dosis untuk pupuk Phonska sebanyak  $300 \text{ kg ha}^{-1}$  dan pupuk urea sebanyak  $200 \text{ kg ha}^{-1}$  yang diberikan dua kali; masing-masing setelah dosis. Pemupukan pertama, dilakukan pada saat tanam dan pemupukan kedua dilakukan setelah tanaman berumur 28 hari. Pemupukan pertama, dilakukan dengan menugal sebelah kiri atau kanan lubang tanam dengan jarak sekitar 10 cm dari lubang tanam; sedangkan pemupukan kedua, dilakukan dengan menugal di antara tanaman dalam barisan.

Penyulaman dan penjarangan dilakukan untuk mempertahankan jumlah tanaman satu per lubang. Penyulaman dilakukan pada umur tanaman 10 hari setelah tanam. Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang mati atau tidak tumbuh, dengan menggunakan tanaman cadangan. Penjarangan dilakukan pada umur 14 hari setelah tanam, dengan mencabut salah satu tanaman yang pertumbuhannya lebih jelek pada setiap lubang.

Penyiangan dan pembumbunan dilakukan untuk mengendalikan gulma sekaligus memperkokoh tanaman. Penyiangan dilakukan dengan menyemprotkan herbisida Calaris 550 SC

pada umur 17 hari setelah tanam. Pembumbunan dilakukan pada umur 25 hari setelah tanam dengan cara mencangkul tanah di antara barisan tanaman. Tanah tersebut ditimbunkan ke kiri dan ke kanan, sehingga nampak seperti guludan pada setiap baris.

Pengairan dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian dengan selang waktu 10 hari hingga umur 70 hari setelah tanam. Pengairan dilakukan dengan cara leb, yakni petakan digenangi hingga permukaan air rata dengan permukaan tanah; selanjutnya air dialirkan ke petakan yang lain. Pengendalian hama penggerek bunga jantan, dilakukan dengan menyemprotkan larutan Alika 247 ZC dicampur dengan Prevaton 50 SC pada umur 38 hari. Dengan dosis  $400 \text{ Lha}^{-1}$

Panen dilakukan setelah 85 % tanaman dalam setiap plot memenuhi kriteria panen. Kriteria panen yang digunakan yaitu rambut tongkol telah kering, biji keras, kelobot telah berwarna kuning dan kering, serta biji mengkilap dan apabila dipijit tidak berbekas.

### ***Variabel dan analisis data***

Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun total per tanaman, jumlah daun segar saat panen, diameter tongkol, panjang tongkol, bobot tongkol kering panen per tanaman, bobot brangkasan segar per tanaman dan bobot biji kering pipil per tanaman.

Ragam genetik total diperoleh dengan menggunakan analisis statistik sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung ragam fenotipe setiap perlakuan dengan rumus:

$$\sigma^2 P_j = \frac{(\sum x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- 2) Pendugaan ragam lingkungan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$\sigma^2 E = (\sigma^2 P_{Bisi 2} + \sigma^2 P_{NK212})$$

3) Menghitung ragam genetik total setiap perlakuan dengan rumus:

$$\sigma^2G_j = \sigma^2P_j - \sigma^2E$$

dengan j bergerak dari 0 sampai 8.

4). Perbedaan ragam genetik total populasi siklus 8 diuji dengan uji-F pada taraf nyata 5 persen sebagai berikut:

$$F_{hit} = \frac{\sigma^2G_{P0}}{\sigma^2G_{P8}}; \text{ kemudian dibandingkan dengan } F_{0,05}$$

Guna menentukan perbedaan daya hasil dan sifat lain antar perlakuan, maka dilakukan analisis ragam dan selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan Uji beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5 %.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data tentang ragam fenotip sifat yang diamati untuk setiap populasi disajikan pada Tabel 1 dan ragam genetik totalnya, disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

### Letakan Tabel 1 disini

Keragaman sifat dalam suatu populasi disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan, yang besarnya diukur dan dinyatakan sebagai varian. Keragaman genetik merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan genotipe dalam populasi. Keragaman fenotip yang terjadi merupakan akibat adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan (Andriani *et al.*, 2015). Ragam fenotip pada Tabel 1, ini digunakan untuk menghitung besarnya ragam genetik total setiap sifat yang diamati pada setiap siklus seleksi. Nilai rata-rata ragam fenotip hibrida Bisi-2 dan NK212 merupakan penduga untuk ragam lingkungan. Oleh karena itu, ragam genetik total diperoleh dari pengurangan ragam fenotip setiap sifat dengan rata-rata ragam

fenotip dua hibrida. Seluruh sifat yang diamati, memiliki ragam fenotip yang lebih besar dibanding rata-rata ragam fenotip dua hibrida. Hal ini ini dapat terjadi karena hibrida merupakan F1; yang tersusun dari genotip seragam; sedangkan populasi hasil seleksi merupakan komposit; yang terdiri atas berbagai genotip (Mejaya, *et al.*, 2010). Hal tersebut menyebabkan penampilan tanaman di lapangan akan lebih seragam pada populasi hibrida dibanding populasi setiap siklus seleksi (Kutka, 2011) .

**Letakan Tabel 2 disini.**

**Letakan Tabel 3 disini**

Pada Tabel 2 dan Tabel 3 terlihat, bahwa ragam genetik total populasi siklus ketujuh dan kedelapan lebih kecil dibanding ragam genetik total populasi awal untuk seluruh sifat yang diamati, kecuali bobot biji kering pipil per tanaman, hanya populasi siklus ke delapan yang lebih kecil. Ragam genetik total mulai populasi siklus ketiga jumlah daun total per tanaman dan bobot brangkasan segar per tanaman lebih kecil dibanding populasi awal. Hal ini menunjukkan, bahwa rekombinasi genetik tidak mampu mempertahankan keragaman sejak siklus ketiga. Selain itu mungkin pula disebabkan oleh jumlah tanaman terpilih lima persen yang kurang besar. Jumlah tanaman terpilih menentukan nilai intensitas seleksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Peter dan Lamkey (2000), bahwa intensitas seleksi turut pula berperan dalam mempertahankan keragaman genetik pada populasi berulang.

Sifat yang diseleksi adalah bobot tongkol kering panen dan bobot berangkasan segar, sedangkan sifat yang diperbaiki adalah bobot biji kering pipil dan bobot berangkasan segar. Berdasarkan Tabel 2, ragam genetik sifat yang diseleksi pada bobot tongkol kering panen berubah secara nyata pada populasi P7IS dan P8IS; sedangkan pada bobot berangkasan segar menunjukkan ragam genetik yang berubah secara nyata pada populasi P3IS, P5IS, P6IS, P7IS,

dan P8IS. Ragam genetik pada daya hasil atau bobot biji kering pipil berubah secara nyata pada populasi P8IS. Perubahan ragam genotip total secara nyata menunjukkan bahwa nilai ragam populasi suatu siklus tidak sama dengan populasi awal (P0). Ragam genetik pada P8IS lebih kecil dibanding dengan P0. Hal ini disebabkan oleh proses seleksi yang telah dilakukan selama 8 siklus. Semakin banyak siklus seleksi, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan rerata yang umumnya semakin meningkat. Peningkatan rerata akan diikuti oleh pengurangan ragam genetik pada populasi yang diseleksi. Berkurangnya ragam genetik total disebabkan oleh dalam melakukan seleksi, dipilih tanaman-tanaman yang bobot tongkol dan bobot brangkasan segar lebih tinggi sebanyak 5%, sehingga didalam populasi hasil seleksi akan menjadi lebih seragam. Penurunan tersebut terjadi akibat berkurangnya frekuensi gen dan frekuensi genotip yang berkenan.

Persentase penurunan ragam genetik total sifat yang diseleksi dan sifat yang diperbaiki berbeda seperti terlihat pada Gambar 1. Persentase penurunan paling tinggi, yakni 99.75 % terjadi pada bobot brangkasan segar per tanaman, kemudian diikuti oleh bobot tongkol kering panen per tanaman sebesar 84.99 % dan penurunan paling kecil terjadi pada bobot biji kering pipil per tanaman (daya hasil), yakni sebesar 42.51 %. Hal ini dapat terjadi karena bobot brangkasan segar per tanaman merupakan sifat yang diseleksi sekaligus sifat yang diperbaiki. Daya hasil merupakan sifat yang diperbaiki melalui bobot tongkol kering panen per tanaman, sehingga penurunan ragam genetiknya paling kecil.

#### **Letakan Gambar 1 disini.**

Setiap siklus seleksi dilakukan rekombinasi genetik guna mempertahankan ragam genetik. Penurunan ragam genetik secara nyata mengindikasikan bahwa rekombinasi genetik yang dilakukan tidak mampu mempertahankan keragaman genetik atau rekombinasi genetik

tidak efektif. Sifat bobot tongkol kering panen menunjukkan bahwa pada populasi siklus ke-7 dan ke-8 terjadi penurunan nilai ragam genetik yang besar; berarti rekombinasi genetik mampu mempertahankan keragaman genetik populasi hingga siklus keenam; namun untuk brangkasan segar per tanaman efektif hingga siklus kedua. Penurunan ragam genetik secara nyata terjadi pada siklus ke delapan; berarti rekombinasi genetik efektif hingga siklus ke tujuh. Peter dan Lamkey (2000) memperoleh, bahwa ragam genetik daya hasil jagung tidak berubah setelah dilakukan lima siklus seleksi..

Seleksi massa dengan indeks seleksi menyebabkan perubahan rerata populasi pada setiap siklus seleksi, seperti terlihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. Pada Tabel 4 terlihat, bahwa jumlah daun segar saat panen dan bobot brangkasan segar lebih besar dibanding populasi awal mulai siklus pertama; namun tinggi tanaman mulai siklus kedua. Jumlah daun total per tanaman tidak mengalami peningkatan akibat delapan siklus seleksi.

**Letakan Tabel 4 disini**

**Letakan Tabel 5 disini**

Pada Tabel 5 terlihat pula, bahwa diameter tongkol lebih besar sejak siklus siklus pertama; panjang tongkol dan bobot tongkol kering panen per tanaman sejak siklus kelima dan untuk daya hasil (bobot biji kering pipil per tanaman) lebih tinggi dibanding populasi awal sejak siklus keenam. Nilai koefisien korelasi fenotipik antara daya hasil dengan sifat lain disajikan pada Tabel 6.

**Letakan Tabel 6 disini**

Pada Tabel 6 terlihat, seluruh sifat yang diamati memiliki nilai koefisien korelasi positif nyata dengan daya hasil; namun besarnya berlainan. Jumlah daun total per tanaman dan jumlah daun segar saat panen per tanaman memiliki nilai koefisien korelasi  $< 0.50$  dan sifat lain  $> 0.50$ .

Rata-rata daya hasil lebih tinggi dibanding populasi awal sejak siklus ke enam; bahkan oleh Aini (2018), membuktikan daya hasil tersebut lebih tinggi sejak siklus ke lima. Peningkatan rerata terjadi karena setiap siklus seleksi terjadi peningkatan frekuensi gen dan frekuensi genotip daya hasil. Beberapa sifat meningkat secara nyata sejak siklus pertama dan ada juga yang meningkat sejak siklus ke dua. Hal ini dapat terjadi karena setiap sifat disusun oleh jumlah lokus yang berlainan, sehingga perubahan frekuensi gen dan fekuensi genotipenya berlainan. Lokus-lokus penyusun setiap sifat dalam kromosum dapat terjadi tautan dan keamatan tautan tersebut dapat dilihat dari korelasinya. Rata-rata daya hasil lebih tinggi pada P8IS terjadi karena tanaman lebih tinggi (Tabel 4), ukuran tongkol lebih besar dan lebih panjang serta bobot tongkol lebih tinggi (Tabel 5). Nilai koefisien korelasi sifat-sifat tersebut juga mendukung, yakni korelasinya positif nyata. Tanaman yang tinggi akan memiliki kemampuan menangkap cahaya matahari lebih banyak, sehingga fotosintat yang dihasilkan lebih banyak. Fotosintat yang banyak mampu diterima oleh *sink* tanaman sehingga akan menyebabkan komponen hasil dan hasil yang lebih tinggi. Hal sama diperoleh oleh Subaedah *et al.* (2016), bahwa daya hasil semakin tinggi akibat tongkol semakin panjang dan oleh Abdalla *et al.* (2010), daya hasil memiliki koefisien korelasi positif nyata dengan bobot tongkol kering panen. Al-Naggar *et al.* (2016), juga memperoleh bahwa komponen hasil memiliki korelasi kuat dengan daya hasil. Nilai koefisien korelasi daya hasil dengan panjang tongkol dan bobot tongkol kering panen berturut-turut 0.70 an 0.85 (Tabel 6).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ragam genetik total daya hasil, bobot tongkol kering panen, dan berangkasan segar populasi siklus ke delapan hasil seleksi massa menggunakan indeks seleksi lebih kecil dibanding populasi awal. Rata-rata daya hasil, bobot tongkol kering panen, dan berangkasan segar

populasi hasil seleksi siklus ke delapan lebih tinggi dibanding populasi awal. Seleksi massa dengan indeks seleksi sebaiknya tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya, namun perlu adanya upaya untuk meningkatkan keragaman genetik khususnya untuk sifat yang diseleksi dan sifat yang diperbaiki.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, A., M. F. Mahmoud, A. M. El. Naim. 2010. Evaluation of Some Maize (*Zea mays* L.) Varieties in Different Enviromnents of The Nuba Mountain, Sudan. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4 (12): 6605 – 6610.

Aini, H. 2018. Uji Daya Hasil Tanaman Jagung Hasil Seleksi Indeks Di Lahan Kering. Skripsi. Fakultas Pertanian Unram. Mataram. 54 h.

Al-Naggar, A.M.M, M. M. M. Atta, M. A. Ahmed and A. S. M. Younis. 2016. Direct vs Indirect Selection for Maize (*Zea mays* L.) Tolerance to High Plant Density Combined with Water Stress at Flowering. Journal of Applied Life Sciences International 7(4): 1-17

Andriani, Suwarni W.B., S.H. Sutjahjo. 2015. Pendugaan Keragaman Genetik dan Heritabilitas Jagung Hibrida Silang Puncak pada Perlakuan Cekaman kekeringan. Informatika Pertanian 24: 91-100.

Asghar, M.J. and S.S. Mehdi. 2010. Selection Indices for Yield and Quality Traits in Sweet Corn. *Pak. J. Bot.*, 42(2): 775-789.

Metode Seleksi Indeks. 2012. <http://pttitb.wordpress.com/category/06-seleksi-berdasarkan-karakter-kriteria-seleksi/62-seleksi-langsung/>. [14 November 2018].

Kutka, F. 2011. Open-Pollinated vs Hybrid Maize Cultivars. Sustainability 3 (9): 1531 – 1554.

Mejaya, M. J., Azrai, R. N. Iriany. 2010. Pembentukan Varietas Unggul Jagung Bersari Bebas. hal. 55 - 73. *Dalam Jagung: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Jakarta.

Peter S. G. & K. R. Lamkey. 2000. Effective Population Size and Genetic Variability in the BS11 Maize Population. *Crop Sci.* (40):338–346.

Subaedah, St., A. Takdir, Netty, D. Hidrawati. 2016. Evaluation of Potential Production of Maize Genotypes of Early Maturity in Rainfed Lowland. *International of Agricultural and Biosystems Engineering* 10 (10): 638 – 641.

Sudika I.W., Parwata A.I.G.M., Soemeinaboedhy Ny. 2018. Respon Seleksi Massa Secara Tidak Langsung Terhadap Daya Hasil Tanaman Jagung Selama Tujuh Siklus di Lahan kering. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*. 2: 144-152

Syukur M., S. Sujiprihati, R. Yuniarti. 2012. Teknik Pemuliaan Tanaman. Penebar Swadaya, Jakarta

Tabel 1. Ragam fenotip setiap populasi untuk setiap sifat yang diamati

Populasi	Ragam fenotip							
	1	2	3	4	5	6	7	8
P0	1338.69	2.30	3.49	0.22	7.71	1986.72	7132.79	589.33
P1IS	1221.65	2.08	2.98	0.23	7.18	1704.17	7515.72	573.32
P2IS	1210.34	2.27	2.96	0.20	6.87	1714.58	6214.79	555.65
P3IS	1207.38	1.98	2.85	0.19	7.42	1750.96	5523.66	575.28
P4IS	1293.42	1.98	2.44	0.19	7.45	1742.16	5806.43	563.16
P5IS	1216.46	2.14	2.42	0.20	7.08	1685.78	5257.51	518.55
P6IS	1128.09	2.01	2.71	0.16	5.62	1523.28	4678.26	519.99
P7IS	960.92	2.01	2.46	0.10	4.83	1294.54	4369.38	549.34
P8IS	993.98	2.04	2.39	0.09	4.80	828.76	4155.62	448.56
Bisi-2	527.77	1.91	1.58	0.05	2.61	585.90	3950.48	255.06
NK212	465.86	1.31	1.65	0.04	1.77	662.70	4345.97	261.18
Rata-rata 2 Hibrida	496.81	1.61	1.61	0.04	2.19	624.30	4148.23	258.12

Keterangan: 1. Tinggi tanaman (cm). 2. jumlah daun total (helai). 3. jumlah daun segar (helai). 4. diameter tongkol (cm). 5. panjang tongkol (cm). 6. bobot tongkol kering panen per

tanaman (g). 7. bobot brangkasan segar per tanaman (g) dan 8. bobot biji kering pipil per tanaman (g).

Tabel 2. Ragam genetik total setiap populasi untuk tinggi tanaman, jumlah daun total, jumlah daun segar saat panen dan bobot brangkasan segar per tanaman

Populasi	Sifat yang diamati							
	1		2		3		4	
	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$
P0	841.88 a		0.69 a		1.88 a		2984.56 a	
P1IS	724.84 a	117.04	0.47 a	0.22	1.37 a	0.51	3367.49 a	382.93
P2IS	713.53 a	128.35	0.66 a	0.03	1.35 a	0.53	2066.56 a	918.00
P3IS	710.57 a	131.31	0.37 b	0.32	1.24 a	0.64	1375.43 b	1609.13
P4IS	796.61 a	45.27	0.37 b	0.32	0.83 b	1.05	1658.20 b	326.36
P5IS	719.65 a	122.23	0.53 b	0.16	0.81 b	1.07	1109.28 b	1875.28
P6IS	631.28 a	210.60	0.40 b	0.29	1.10 b	0.79	530.03 b	2454.53
P7IS	464.11 b	377.77	0.40 b	0.29	0.85 b	1.03	221.15 b	2763.41
P8IS	497.17 b	344.71	0.43 b	0.26	0.78 b	1.10	7.39 b	2977.17


Keterangan:Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan P0 pada uji- $F_{0.05}$ .  $\sigma^2 G$ : ragam genetik.  $\Delta\sigma^2 G$ . perubahan ragam genetik.  
1. tinggi tanaman (cm). 2. jumlah daun total per tanaman (helai). 3. jumlah daun segar per tanaman saat panen (helai) dan 4. bobot brangkasan segar per tanaman.

Tabel 3. Ragam genetik total komponen hasil dan hasil tanaman jagung

Populasi	Sifat yang diamati							
	1		2		3		4	
	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$	$\sigma^2 G$	$\Delta\sigma^2 G$
P0	0.18 a		5.52 a		1362.42 a		331.21 a	
P1IS	0.19 a	0.01	4.99 a	0.53	1079.87 a	282.55	315.20 a	16.01
P2IS	0.16 a	0.02	4.68 a	0.84	1090.28 a	272.14	297.53 a	33.68
P3IS	0.15 a	0.03	5.23 a	0.29	1126.66 a	235.76	317.16 a	14.04
P4IS	0.15 a	0.03	5.26 a	0.26	1117.86 a	244.55	305.04 a	26.17
P5IS	0.16 a	0.02	4.89 a	0.63	1061.48 a	300.94	260.43 a	70.77
P6IS	0.12 a	0.06	3.43 b	2.09	898.98 a	463.44	261.87 a	69.34
P7IS	0.06 b	0.12	2.64 b	2.88	670.24 b	692.18	291.22 a	39.98
P8IS	0.05 b	0.13	2.61 b	2.91	204.46 b	1157.95	190.44 b	140.77

Keterangan:Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap P0 pada uji- $F_{0.05}$ .  $\sigma^2 G$ : ragam genetik.  $\Delta\sigma^2 G$ . perubahan ragam

genetik. 1. diameter tongkol (cm). 2. panjang tongkol (cm). 3. bobot tongkol kering panen per tanaman (g) dan 4. Bobot biji kering pipil per tanaman (g).



Gambar 1. Persentase penurunan ragam genetik total tiga sifat tanaman jagung.

Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman. jumlah daun total. jumlah daun segar saat panen dan bobot brangkasan segar per tanaman setiap perlakuan

Populasi	Sifat-sifat yang diamati			
	1	2	3	4
P0	179.52 a	10.85	6.00 a	219.58 a
P1IS	182.54 a	10.95	6.85 b	284.86 b
P2IS	198.74 b	11.00	6.77 b	275.22 b
P3IS	194.11 b	10.92	7.00 b	281.94 b
P4IS	194.01 b	10.42	7.00 b	279.45 b
P5IS	193.36 b	11.12	7.13 b	330.88 b
P6IS	205.94 b	10.92	6.80 b	340.61 b
P7IS	206.47 b	11.40	7.25 b	346.62 b
P8IS	209.65 b	11.40	7.32 b	351.47 b
BNT <sub>0.05</sub>	10.89		0.54	43.65

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan P0 pada uji BNT<sub>0.05</sub>. 1. tinggi tanaman (cm). 2. jumlah daun total per tanaman (helai). 3. jumlah daun segar per tanaman saat panen (helai) dan 4. bobot brangkasan segar per tanaman (g).

Tabel 5. Rata-rata sifat komponen hasil dan hasil tanaman jagung setiap perlakuan

Populasi	Sifat sifat yang diamati			
	1	2	3	4
P0	4.01 a	10.48 a	103.18 a	57.21 a
P1IS	4.16 b	11.07 a	114.82 a	58.80 a
P2IS	4.21 b	11.62 a	118.17 a	62.44 a
P3IS	4.12 b	11.63 a	117.97 a	59.69 a
P4IS	4.16 b	11.91 a	118.51 a	62.66 a
P5IS	4.20 b	12.32 b	121.38 b	65.06 a
P6IS	4.30 b	12.57 b	127.78 b	70.54 b
P7IS	4.37 b	12.73 b	130.08 b	75.83 b
P8IS	4.43 b	13.10 b	137.41 b	81.28 b
BNT <sub>0.05</sub>	0.13	1.54	17.82	9.58

Keterangan:Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan P0 pada uji BNT<sub>0.05</sub> . 1. diameter tongkol (cm). 2. panjang tongkol (cm). 3. bobot tongkol kering panen per tanaman (g) dan 4. Bobot biji kering pipil per tanaman (g).

Tabel 6 Nilai koefisien korelasi antar sifat dengan daya hasil (bobot biji kering pipil Per tanaman)

No	Sifat yang Diamati	Koefisien korelasi dengan daya hasil
1	Tinggi tanaman	0.70 s
2	Jumlah daun	0.43 s
3	Jumlah daun segar	0.49 s
4	Bobot berangkasan segar	0.63 s
5	Diameter tongkol	0.87 s
6	Panjang tongkol	0.70 s
7	Bobot tongkol kering panen	0.85 s