

# 1. Submit 11 Agustus 2021

The screenshot shows a journal submission interface. At the top, the journal title 'JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN' is visible, along with a 'Tasks' indicator showing 0. The user is logged in as 'sudika'. The article title is '261 / Sudika et al. / Perbaikan Sudut Daun Populasi Komposit Tanaman jagung Melalui Hibridisasi Dengan Varietas Hibrida'. The page has a 'Library' button in the top right. A navigation menu on the left includes 'Submissions'. The main content area has tabs for 'Workflow' and 'Publication'. Under 'Publication', there are sub-tabs for 'Submission', 'Review', 'Copyediting', and 'Production'. The 'Submission Files' section shows a file named '757-1 admin, 9. FULLPAPER\_KP-08\_SUDIKA - I wayan Sudika.doc' submitted on August 31, 2021, with a 'Download All Files' button. The 'Pre-Review Discussions' section shows a table with one entry: 'Comments for the Editor' from 'sudika2021-08-31' at 12:20 PM, with 0 replies and a 'Closed' status.

JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN Tasks 0 English View Site sudika

261 / Sudika et al. / Perbaikan Sudut Daun Populasi Komposit Tanaman jagung Melalui Hibridisasi Dengan Varietas Hibrida Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Q Search

757-1	admin, 9. FULLPAPER_KP-08_SUDIKA - I wayan Sudika.doc	August 31, 2021	Article Text
-------	---	-----------------	--------------

Download All Files

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	sudika2021-08-31	12:20 PM	0	<input type="checkbox"/>



## **Perbaikan Sudut Daun Populasi Komposit Tanaman Jagung Melalui Hibridisasi dengan Varietas Hibrida**

### *Leaf Angle Improvement of Corn Composite Population Through Hybridization with Hybrid Varieties*

**I Wayan Sudika\*, Dwi Ratna Anugrahwati**

Program Studi Agroekoteknologi, Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram

\*Corresponding Author Email: [sudikawayanms@gmail.com](mailto:sudikawayanms@gmail.com)

Manuscript received: 08-12-2020. Accepted: 05-04-2021

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata sudut daun, umur panen dan daya hasil F1 hasil persilangan komposit dengan hibrida; nilai heterosis dan mengetahui efek maternal ketiganya tersebut pada tanaman jagung. Percobaan telah dilaksanakan di lahan sawah irigasi teknik mulaibulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan acak kelompok dengan dua ulangan. Perlakuan sebanyak 28 F1 hasil persilangan P8IS vs NK212 dan P8IS vs NK7328 dan resiproknya masing-masing. Data hasil percobaan dianalisis dengan analisis sidik ragam dan diuji lanjut dengan uji BNT pada taraf nyata 5 persen. Nilai heterosis dihitung atas dasar tetua yang nilainya lebih tinggi. Uji t pada taraf nyata 5 %, digunakan untuk mengetahui nyata/tidaknya efek maternal. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata sudut daun galur F1 hasil persilangan dan resiprok P8IS vs NK212 sama dengan kedua tetua; sedangkan persilangan P8IS vs NK7328 berbeda. Resiprok persilangan nomor 13 (P8IS vs NK7328 (R13)) memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS dan sama dengan sudut daun NK7328. Umur panen super genjah diperoleh pada hasil persilangan P8IS vs NK212 nomor 1, 5, persilangan P8IS vs NK7328 nomor 11 dan 12. Daya hasil antargalur F1 kedua macam persilangan sama dengan masing-masing kedua tetua; namun terjadi kecenderungan kenaikan daya hasil dibanding P8IS untuk sebagian besar galur F1. Terjadi perubahan sifat sudut daun, umur panen dan daya hasil galur F1 dibanding salah satu tetua terbaik dengan nilai heterosis bersifat negatif dan positif dengan variasi dari 0.00 hingga 65.70 persen. Keamatan hubungan nilai heterosis dengan rata-rata sifat tergolong kuat diperoleh pada umur panen; sedang untuk daya hasil dan lemah untuk sudut daun. Ketiganya sifat pada kedua macam persilangan menunjukkan tidak ada efek maternal. Sudut daun yang lebih kecil, umur panen tetap super genjah dan daya hasil lebih tinggi, sangat dimungkinkan diperoleh pada galur-galur kedua macam persilangan.

**Kata kunci:** Daya hasil; heterosis; efek maternal; sudut daun; umur panen

#### **ABSTRACT**

**Comment [H1]:** Abstrak dibuat dengan tidak lebih 250 kata....!!

This study aims to determine the average leaf angle, harvest age and yield of F1 from cross-hybrid composite; heterosis value and knowing the maternal effect of these three traits on maize. The experiment was carried out in technically irrigated rice fields from November 2019 to February 2020. The design used in this experiment was a randomized block design with two replications. The treatment was 28 F1 as a result of crossing P8IS vs NK212 and P8IS vs NK7328 and their respective reciprocal crosses. The experimental data were analyzed by means of analysis of variance and further tested with the LSD test at the 5 percent level. Heterosis values were calculated on the basis of the parents whose scores were higher (High Parent Heterosis). The t test at the 5% level was used to determine whether the maternal effect was significant. The results showed that the mean leaf angles of F1 lines from crosses and reciprocal P8IS vs NK212 were the same as the two parents; whereas the P8IS vs NK7328 cross is different. The reciprocal of cross number 13 (P8IS vs Nk7328 /R13) has smaller leaf angle than P8IS and is the same as the leaf angle of NK7328. The yield of the F1 lines from the two types of crosses was the same as each of the two parents; however, there was a tendency for an increase in yield compared to P8IS for most of the F1 lines. There was a change in leaf angle properties, harvest age and yield of F1 lines compared to one of the best parents with heterosis values are negative and positive with variations from 0.00 to 65.70 percent. Coefficient of correlation between heterosis with the average value of traits was classified as strong for the harvest age; moderate for yield and weak for leaf angle. These three traits in the two types of crosses showed no maternal effects. Smaller leaf angle, super early harvest age and higher yield, are possible to be obtained from the lines of both crosses.

**Keyword:** yield; heterosis; maternal effect; leaf angle; harvest age

## PENDAHULUAN

Sekitar 60 persen penanaman jagung di Indonesia dilakukan di lahan kering, sehingga sangat diperlukan varietas yang tahan terhadap ancaman kekeringan (Indriani dan Mejaya, 2012).

Varietas unggul merupakan salah satu faktor penting dalam usaha meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Selanjutnya Suherman dan Awaludin (2007) mengatakan benih jagung bermutu yang murni dari varietas jagung komposit dapat menjamin tercapainya produktivitas tinggi. Salah satu faktor penentu produktivitas adalah populasi. Populasi yang optimum untuk menghasilkan produktivitas maksimal tergantung dari kondisi alam fase pengisian biji, yakni cahaya yang diteruskan sekitar 95 persen (Andrade *et al.*, 2002). Salah satu penentu populasi optimum adalah sudut daun.

Populasi P8IS merupakan populasi hasil seleksi yang memiliki daya hasil lebih tinggi dibandingkan varietas unggul (Gumarang) Populasi ini memiliki umur panen super genjah di lahan kering dan sudut daun yang lebar (Sudika, *et al.*, 2019). Peningkatan daya hasil masih dapat dilakukan dengan memperbaiki sudut daun, yakni lebih kecil. Sudut daun yang lebih kecil menunjukkan keadaan daun lebih tegak,

sehingga lebih efektif memanfaatkan cahaya matahari dan dapat ditanam lebih rapat. Disisi lain, varietas hibrida beredar sekarang termasuk hibrida komersial dengan sudut daun kecil. Hasil

pengamatan pendahuluan, bahwa sudut daun P8IS berkisar 50o – 60o; sedangkan hibrida NK212 rata-rata 33,100, dan NK7328, 31,250. Berdasarkan data tersebut, maka telah dilakukan P8IS dengan Hibrida NK212 dan NK7328 dengan tujuan untuk memperoleh galur yang memiliki sudut daun dengan umur panen tetap super genjah dan hasil minimal sama dengan P8IS.

Gunanya memperoleh keturunan yang memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS, umur panen genjah/super genjah dan daya hasil tinggi, maka telah dilakukan hibridasi secara resiprok dan dihasilkan sejumlah F1. Galur-galur F1

initelah dievaluasi untuk memberikan gambaran terhadap terjadinya kombinasi sifat-sifat pada F1 tersebut, sekaligus dapat dikaji heterosis dan efek maternal sifat kuantitatifnya.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah galur-galur F1 sebanyak 28 Galur dengan rincian hasil persilangan P8IS vs hibrida NK212 sebanyak 10 dan hasil persilangan P8IS vs NK7328 sebanyak 18 galur, P8IS, NK212 dan NK7328. Bahan-bahan lain, yaitu pupuk Phonska Urea dan pupuk organik Petroganik serta pestisida (Calaris 550 SC, Furadan 3G dan Saromyl 35 SD).

### **Metode Penelitian dan Rancangan Percobaan**

Metode eksperimental digunakan dalam penelitian ini dengan percobaan di lahan sawah irigasi teknik, yakni di lahan praktek Fakultas Pertanian di desa Lembuak Lombok Barat. Percobaan dimulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Ketinggian tempat sekitar 250 m dpl. Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan acak kelompok dengan dua ulangan. Jumlah perlakuan sebanyak 31 genotipe, yaitu 28 galur F1 hasil persilangan dan resiproknya serta 3 tetua.

### **Pelaksanaan**

Persiapan lahan meliputi pengolahan tanah, pembuatan blok-blok dan saluran irigasi. Pengolahan tanah, dilakukan dengan membajak dan menggaru masing-masing satu kali menggunakan hand traktor. Tanah yang telah diolah pada petak percobaan, kemudian diratakan. Selanjutnya petak percobaan dibagi dua; masing-masing dengan ukuran 5,8 x 4 m. Setiap bagian merupakan satu blok. Jarak antar blok 1 m dan dibuat saluran selebar 40 cm. Pada sekeliling petakan juga dibuat saluran irigasi untuk memperlancar pembuangan air hujan.

Benih jagung yang digunakan terlebih dahulu diberi Saromyl 35 SD dengan dosis sebanyak 5 g/1. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit bulai. Penanaman dilakukan dengan menggunakan jarak tanam 20 x 60 cm. Setiap perlakuan terdapat dua baris dalam satu baris ditanam 20 tanaman. Pembuatan lubang tanam, dilakukan dengan menggunakan tugal sedalam sekitar 5 cm. Jumlah benih per lubang sebanyak 1 biji. Pada setiap lubang tanam diisi Furadan 3 G dengan dosis 20 kg/ha. Selanjutnya lubang tanam ditutup dengan pupuk organik Petroganik dengan dosis 500 kg/ha.

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk Phonska dosis 300 kg/ha dan 200 kg/ha Urea yang diberikan 2 kali. Pemupukan pertama diberikan pupuk Phonska dengan dosis 150 kg/ha saat tanam ditambah 100 kg/ha Urea. Pemupukan kedua pada umur 30 hari setelah tanam pupuk Phonska dengan dosis 150 kg/ha dan 100 kg/ha pupuk Urea. Pupuk diberikan dengan cara ditugal ke dalam 9-10 cm disamping tanaman dan ditutup tanah.

Pengairan tanaman jagung bersumber dari air irigasi teknis. Pengairan dilakukan dengan cara di alir hingga air rata dengan tanah kemudian air dibiarkan hingga meresap ke dalam tanah. Pengairan dilakukan pada umur 10 hari dan 24 hari setelah tanam. Pengairan selanjutnya tidak dilakukan karena turun hujan.

Penyulam dilakukan pada 10 hari setelah tanam dengan memindahkan tanaman acuan yang ditanam di antarbarisan di dalam plot. Pengendalian gulma dilakukan dengan menggunakan herbisida Calaris. Penyemprotan dilakukan pada umur 15 hari setelah tanam. Konsentrasi yang digunakan adalah 75 cc/16 liter air (3 cc/liter air).

Pembunuhan tanaman jagung dilakukan 1 minggu setelah penyemprotan Calaris dengan cara mencangkul tanah di antarbarisan tanaman, kemudian tanah tersebut ditempatkan pada barisan tanaman di sebelah kiri dan kanan.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman jagung yaitu dengan menggunakan Furadan 3G yang diberikan pada lubang tanam pada saat tanam. Pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung menggunakan saromyl 35 SD. Pengendalian hama dan penyakit berikutnya tidak dilakukan karena tidak ada serangan hama dan penyakit pada percobaan. Panen dilakukan apabila tanaman telah menunjukkan kriteria panen, yaitu kelobot dan rambut tongkol telah kering dan bijit telah mengeras apabila tidak dengan kuku tidak berbekas.

### Variabel Yang Diamati dan Analisis Data

Variabel yang diamati meliputi usia dan umur panen dan daya hasil. Sudut diamati pada fase pengisian biji. Umur panen, diperoleh dengan menghitung hari sejak tanam hingga 85 persen tanaman setiap plot telah siap panen. Daya hasil diukur dari bobot biji kering pipil per tanaman.

Data hasil percobaan dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 persen. Apabila F hitung perlakuan lebih besar dibanding F tabel, maka dilakukan uji lanjut dengan uji bedanya terkecil (BNT) pada taraf nyata 5 persen.

Nilai heterosis diperoleh, dengan rumus sebagai berikut (Ujianto, *et al.*, 2020).

HPH

Keterangan :

F1 = Rerata penampilan suatu galur.

HP = Rerata penampilan tetua tertinggi.

Selanjutnya, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi berdasarkan nilai heterosis yang diperoleh.

Nilai efek maternal diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$ME (\%) = (G_x - G_y) / G_y \times 100$$

Dengan

ME = nilai efek maternal

G<sub>x</sub> = galur hasil persilangan/resiproknya dengan nilai lebih tinggi

G<sub>y</sub> = galur hasil persilangan/resiproknya dengan nilai lebih rendah.

Uji t pada taraf nyata 5 persen, digunakan untuk mengetahui nyata/tidaknya efek maternal suatu sifat.

Korelasi antara heterosis dengan rata-rata setiap sifat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Tingkat keeratan hubungan antar variabel ditetapkan dengan mengikuti kriteria Guilford (1956 *cit.* Somantri & Muhidin, 2006), seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat keeratan hubungan antar variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi (r)

Kisaran Nilai Koefisien Korelasi (r)		Kategori
Bertanda positif	Bertanda negatif	
$0.00 < r < 0.20$	$-0.20 < r \leq 0.00$	Sangat Lemah
$0.20 \leq r < 0.40$	$-0.40 < r \leq -0.20$	Lemah
$0.40 \leq r < 0.70$	$-0.70 < r \leq -0.40$	Sedang
$0.70 \leq r < 0.90$	$-0.90 < r \leq -0.70$	Kuat
$0.90 \leq r < 1.00$	$-1.00 < r \leq -0.90$	Sangat Kuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Nilai rerata setiap sifat pada persilangan P8IS vs Nk 212 disajikan pada Tabel 2 dan untuk persilangan P8IS vs NK7328 disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 4 dan Tabel 5, disajikan berturut-turut untuk nilai heterosis setiap galur untuk persilangan P8IS vs NK212 dan P8IS vs NK7328. Pada Tabel 6, disajikan nilai efek maternal dan Tabel 7 disajikan keeratan hubungan nilai heterosis dengan rata-rata sifat.

Tabel 2. Rerata tiga sifat untuk galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Sifat-sifat yang diamati *)		
		Sudut daun ( $^{\circ}$ )	Umur panen (hari)	Daya hasil ( $g\ tan^{-1}$ )
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (1)	53.75	78.00 a	99.38
2	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R1)	55.63	91.00 bc	74.75
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (2)	53.75	85.00 a	73.19
4	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R2)	54.38	86.00 a	70.88
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (3)	52.25	78.00 a	95.13
6	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R3)	54.00	98.00 ac	101.75
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (4)	55.25	82.00 a	89.00
8	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R4)	55.63	88.00 a	85.49
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (5)	47.50	85.00 a	84.75
10	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R5)	62.13	90.00 b	75.25
11	Tetua NK212	49.50	95.00 c	58.38
12	Tetua P8IS	51.88	79.00 a	71.63
Nilai BNT <sub>0.05</sub>		-	9.11	-

Keterangan: \*) Angka-angka pada kolom samadikuti oleh huruf samatidakberbedanyatadengan uji BNT<sub>0.05</sub>

Pada Tabel 2 ditunjukkan, bahwa seluruh galur hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya masing-masing, memiliki sudut daun samadengankeduatetua. Hal ini didasarkan atas analisis ragam, bahwa perlakuan tidak berbedanyata.

Galur resiprok hasil persilangan nomor 1 dan nomor 5 memiliki umur panen lebih dalam dibanding tetua P8IS. Galur hasil persilangan lain dan resiproknya, memiliki umur panen sama dengan P8IS; namun terdapat dua galur yang memiliki umur panen super genjah (< 80 hari), yaitu persilangan nomor 1 dan nomor 3. Berdasarkan hasil analisis ragam, bahwa daya hasil perlakuan tidak berbeda nyata; berarti terdapat galur hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya masing-masing sama dengan kedua tetua.

Tabel 3. Rerata tiga sifat yang diamati pada galur hasil persilangan P8IS vs NK7328 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Sifat-sifat yang diamati *)		
		Sudut daun (°)	Umur panen (hari)	Daya hasil (g tan <sup>-1</sup> )
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (6)	49.38 b	83.50 a	85.63
2	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R6)	46.75 bc	94.50 bc	74.38
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (7)	61.63 b	88.00 b	66.00
4	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R7)	48.13 b	98.00 bc	71.25
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (8)	40.63 bc	98.00 bc	87.50
6	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R8)	47.25 bc	94.50 bc	46.50
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (9)	59.38 b	88.00 b	78.88
8	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R9)	56.00 b	88.00 b	93.63
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (10)	58.75 b	91.50 bc	91.00
10	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R10)	58.75 b	98.00 bc	73.00
11	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (11)	51.88 b	78.50 a	95.63
12	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R11)	53.13 b	86.50 a	92.75
13	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (12)	48.75 b	79.00 a	87.25
14	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R12)	41.00 bc	85.00 a	70.00
15	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (13)	49.25 b	91.50 bc	86.90
16	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R13)	34.50 c	85.00 b	74.00
17	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (14)	51.88 b	98.00 bc	38.38
18	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R14)	54.38 b	94.50 bc	70.13
19	Tetua NK7328	34.38 c	98.00 c	111.88
20	Tetua P8IS	51.88 b	79.00 a	71.63
Nilai BNT <sub>0,05</sub>		13.59	8.64	-

Keterangan: \*) Angka-angka pada kolom samadikuti oleh huruf samadidakberbedanyatadengan uji BNT<sub>0,05</sub>.

Pada Tabel 3 terlihat, bahwa galur resiprok persilangan P8IS vs NK7328 nomor 13 memiliki sudut daun lebih kecil dibanding sudut daun P8IS dan samadengansudutdauntetua hibridanya. Rata-rata sudut daun yang samadengantetua hibrida dan juga samadengantetua P8IS, yaitu resiprok nomor 6; hasil persilangan nomor 8 dan resiproknya dan resiprok nomor 12. Umur panen hasil persilangan nomor 6; hasil persilangan nomor 11 dan 12 serta resiprok persilangan nomor 11 dan 12 samadengan

P8IS; sedang kangalurlainnya lebih dalam. Galur yang umur panennya tergolong super genjah, yaitu hasil persilangan nomor 11 dan nomor 12. Daya hasil semua galur samadengandaya hasil keduatetua.

Tabel 4. Nilai heterosis (%) tiga sifat setiap galur hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Nilai heterosis (%) setiap sifat yang diamati					
		Sudut daun ( <sup>o</sup> )	Kategori	Umur panen (hari)	Kategori	Daya hasil (g tan <sup>-1</sup> )	Kategori
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (1)	3.61	Rendah	-17.89	Sedang	38.73	Tinggi
2	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R1)	7.23	Rendah	-4.21	Rendah	4.36	Rendah
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (2)	3.61	Rendah	-12.11	Sedang	2.17	Rendah
4	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R2)	4.82	Rendah	-10.00	Rendah	-1.05	Rendah
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (3)	0.72	Rendah	-17.89	Sedang	32.80	Tinggi
6	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R3)	4.10	Rendah	-7.37	Rendah	42.05	Tinggi
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (4)	6.51	Rendah	-13.68	Sedang	24.25	Tinggi
8	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R4)	7.23	Rendah	-10.53	Rendah	19.34	Sedang
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (5)	-8.44	Rendah	-10.53	Rendah	18.32	Sedang
10	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R5)	19.75	Sedang	-4.74	Rendah	5.05	Rendah
	Rata-rata	4.91		-10.89		18.60	

Atas dasar nilai heterosis yang diperoleh, dibuat kategori rendah, sedang dan tinggi. Kategori rendah: 0.00-11.17/-11.17-0.00; sedang 11.18-22.35/-22.35 - -11.18 dan tinggi; > 22.35/<-22.35. Heterosis sudut daun dan daya hasil pada Tabel 4, diukur dari tetua P8IS karena nilai P8IS untuk kedua sifat tersebut lebih tinggi; sedangkan umur panen dihitung dari tetua NK212. Nilai heterosis sudut daun yang semakin tinggi dengan tanda negatif, menunjukkan semakin tinggi berkurangnya sudut daun dibanding sudut daun P8IS. Umur panen yang nilai heterosis semakin tinggi dengan tanda negatif, menunjukkan semakin besar berkurangnya umur panen dibanding tetua NK212. Daya hasil yang semakin tinggi nilai heterosisnya dengan tanda positif;



berartise makin besarpeningkatandayahasildibanding P8IS. Berdasarkan Tabel 4, bahwahasil persilangan nomor 5 memiliki nilai heterosis negatif; berartigalur tersebut memiliki sudut dauncenderung lebih kecil dibanding sudut daun P8IS. Nilai heterosis umur panen seluruhnya negatif; berartise muagalur lebih jenah dibanding umur panen NK212. Nilai heterosis -17.89 % (Tabel 4). Daya hasil seluruh galur memiliki nilai heterosis positif; berartiterjadipeningkatandayahasildibanding P8IS, kecualigalur resiprok hasil persilangan nomor 2 memiliki nilai negatif; berartiterjadipenurunan dayahasil. Rata-rata nilai heterosis dayahasil lebih tinggi dibanding sudut daun dan umur panen. Heterosis sudut daun seluruh persilangan tergolong rendah, kecualiresiprok nomor 5, tergolong sedang. Umur panen memiliki heterosis tergolong rendah dan sedang berturut-turut sebanyak 6 dan 4. Heterosis dayahasil tergolong tinggi sebanyak 4 galur; sedang, 2 dan rendah, 4 galur.

Tabel 5. Nilai heterosis (%) tiap sifat setiap galur hasil persilangan P8IS vs NK7328 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Nilai heterosis (%) setiap sifat yang diamati					
		Sudut daun	Kategori	Umur panen	Kategori	Daya hasil	Kategori
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (6)	-4.83	Rendah	-14.80	Sedang	-23.47	Tinggi
2	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R6)	-9.89	Rendah	-3.57	Rendah	-33.52	Tinggi
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (7)	18.78	Sedang	-10.20	Rendah	-41.01	Tinggi
4	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R7)	-7.24	Rendah	0	Rendah	-36.32	Tinggi
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (8)	<b>-21.69</b>	Sedang	0	Rendah	-21.79	Sedang
6	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R8)	-8.92	Rendah	-3.57	Rendah	-58.44	Tinggi
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (9)	14.45	Sedang	-10.20	Rendah	-29.50	Tinggi
8	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R9)	7.94	Rendah	-10.20	Rendah	-16.32	Sedang
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (10)	13.24	Sedang	-6.63	Rendah	-18.66	Sedang
10	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R10)	13.24	Sedang	0.00	Rendah	-34.75	Tinggi
11	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (11)	-0.01	Rendah	-19.90	Sedang	-14.53	Sedang
12	Hasil resiprok P8IS x NK7328	2.40	Rendah	-11.73	Rendah	-17.10	Sedang

	(R11)						
13	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (12)	-6.03	Rendah	-19.39	Sedang	-22.01	Tinggi
14	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R12)	<b>-20.97</b>	Sedang	-13.27	Sedang	-37.43	Tinggi
15	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (13)	-5.07	Rendah	-6.63	Rendah	-22.33	Tinggi
16	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R13)	<b>-33.50</b>	Tinggi	-10.20	Rendah	-33.86	Tinggi
17	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (14)	-0.01	Rendah	0.00	Rendah	-65.70	Tinggi
18	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R14)	4.81	Rendah	-3.57	Rendah	-37.32	Tinggi
	Rata-rata	-2.41		-7.99		-31.34	

Pada Tabel 5, nilai heterosis umurpanen dan dayahasildidasarkanatas NK7328 karenanilainyalebihtinggidibanding P8IS; sedangkansudutdaunatasdasar P8IS. Sebanyak 11 galurmemilikinilai heterosis sudutdaunnegatif; berartigalurtersebutsudutdaunnyalebihkecildibanding P8IS. dan sisanyapositif. Empatgalurmemilikinilai heterosis nol; berartiumurpanensamadengantetua NK7328; galurlainnyabernilainegatif; berartiumurpanennyalebihgenjahlidibandingtetua NK7328. Pada Tabel 5 juga terlihat, bahwanilai heterosis dayahasilseluruhnyanegatif; berartiseluruhgalurdayahasilnyalebihrendahdibanding NK7328. Nilai heterosis dayahasillebihtinggidibandingnilai heterosis sudutdaun dan umurpanen. Sebagian besargalurmemilikinilai heterosis sudutdauntergolongrendah, yakni 11 galur; tergolongtingghanyasatugalur, yakniresiprokpersilangannomor 13 dan sisanyatergolongsedang, yaknisebanyak 6 galur. Heterosis umurpanentergolongrendahsebanyak 4 galur; sedang 14 galur dan tidakada yang tergolongtinggi. Sebanyak 13 galuruntukdayahasilmemilikinilai heterosis tergolongtinggi; 5 galurtergolongsedang dan tidakadagalur yang tergolongrendah.

Tabel 6. Nilai maternal efek (%) tigasifat yang diamatiuntuksetiapmacampersilangan

No.	Macam persilangan	Nilai efek maternal (%)		
		Sudutdaun	Umurpanen	Daya hasil
1	Persilangan P8IS vs NK212	7.33 ns	8.12 ns	8.17 ns
2	Persilangan P8IS vs NK7328	7.19 ns	3.57 ns	7.74 ns

Pada Tabel 6 terlihat, bahwanilai maternal efeksudutdaun, umurpanen dan dayahasiluntukkeduamacampersilanganbersifattidaknyata. Hal iniberartitidakada maternal efekuntukketigasifattersebut.

Tabel 7. Nilai koefisienkorelasiantarnilai heterosis dengan rata-rata setiapsifat yang diamati

No.	Sifat yang diamati	Nilai koefisienkorelasi	Kriteria
-----	--------------------	-------------------------	----------

1	Sudut daun	-0.34	Lemah
2	Umur panen	-0.80	Kuat
3	Daya hasil	-0.50	Sedang

Pada Tabel 7 terlihat, bahwa sudut daun memiliki nilai koefisien korelasi tergolong lemah, yakni -0,34. Hal ini berarti peningkatan nilai heterosis memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap penurunan sudut daun. Sebaliknya pada sifat umur panen nilai koefisien korelasi sebesar 0.80 tergolong kuat. Semakin tinggi nilai heterosis, maka umur panen semakin rendah. Daya hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0.50 tergolong sedang; nilai heterosis semakin tinggi cukup berpengaruh terhadap penurunan daya hasil.

## Pembahasan

### 1. Kajian perubahan rata-rata populasi akibat hibridisasi

Hibridisasi bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter baik yang terdapat pada tanaman berbeda, menjadi satu genotipe baru. Hibridisasi dapat dilakukan dalam populasi maupun antar populasi (Anonymous, 2009 dan Lupi, 1995). Hasil hibridisasi tersebut dapat diseleksi untuk mendapatkan genotipe unggul sesuai kombinasi karakter yang diinginkan. Populasi P8IS merupakan populasi hasil rakitan kultivar lokal dengan varietas unggul komposit (Gumarang, Sukmaraga dan Lamuru); yang telah diseleksi selama 8 siklus dengan seleksi massal menggunakan teknik indeks seleksi dan dihasilkan komposit P8IS. Umur panen populasi ini tergolong super genjah, yakni < 80 hari (Sudika, *et al.*, 2019a). Kategori tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Balitbang dan Balitseral (2015). Rata-rata daya hasil di lahan kering adalah 7.097 t/ha dan populasi ini tahan terhadap cekaman kekeringan (Sudika, *et al.*, 2019b). Disisi lain, sudut daun masih lebar, sehingga nampak daun agak terkulai. Hal ini merupakan kelemahan sifat populasi P8IS. Peningkatan sudut daun dapat dilakukan melalui hibridisasi dengan tetua yang memiliki sudut daun tergolong sempit. Varietas hibrida modern yang beredar, seperti NK212, NK7328, Bisi-18 dan Pioneer 21 umumnya memiliki sudut daun sempit, sehingga dapat ditanam pada jarak tanam yang lebih rapat (Jaya *et al.*, 2019). Hibrida juga memiliki potensi hasil lebih tinggi dibanding komposit (Takdir *et al.*, 2010). Dua keunggulan yang terdapat pada hibrida ini merupakan sifat yang ingin digabung dengan sifat umur panen super genjah dan tahan cekaman kekeringan yang ada pada P8IS. Penggabungan sifat-sifat unggul tersebut, telah dilakukan melalui hibridisasi secara resiprok menggunakan dua hibrida sebagai tetua, yaitu NK212 dan NK7328. Hasil hibridisasi tersebut berupa galur-galur F1.

Hasil evaluasi galur F1 menunjukkan, bahwa diperoleh satu galur yang memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS dan sama dengan tetua hibridanya, yakni galur resiprok persilangan P8IS vs NK7328 nomor 13. Tiga persilangan memiliki sudut daun sama dengan kedua tetua, yaitu resiprok persilangan nomor 6,

8 dan resiproknomor 12. Persilangan P8IS vs NK212 menghasilkan seluruh galur F1 yang memiliki sudut daun samadengankeduatetua.

Umur panen super genjah diperoleh pada beberapagalur, yaitu hasil persilangan P8IS vs NK212 nomor 1 dan nomor 5 dan hasil persilangan P8IS vs NK7328 nomor 11 dan 12. Seluruh persilangan ini menggunakan P8IS sebagai tetua jantan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sudika (2016), bahwa gen umur super genjah dapat diwariskan dengan menggunakan populasi super genjah sebagai tetua jantan.

Daya hasil seluruh galur F1 samadengankeduatetua pada kedua macam persilangan. Kecendrungan kenaikan hasil dibandingkan keduatetua, terjadi pada semua galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK212. Seluruh galur hasil persilangan P8IS vs NK7328, cenderung turun dibanding tetua hibrida; namun sebagian besar cenderung naik dibanding P8IS, kecuali resiproknomor 7, 8 dan resiproknomor 14.

Uraian di atas memberikan indikasi, bahwa hibridisasi dapat menghasilkan populasi dengan umur panen super genjah, sudut daun sempit dan daya hasil lebih tinggi dibanding P8IS. Masing-masing sifat yang diinginkan tersebut, tidak terdapat dalam satu galur; melainkan pada beberapagalur. Segregasi pada F<sub>2</sub>, akan menentukan galur-galur mana yang ditetapkan sebagai bahan untuk pembentukan populasi dasar, sehingga diperlukan evaluasi galur-galur F<sub>2</sub>.

## **2. Kajian heterosis**

Heterosis merupakan gejala, bahwa persilangan dua genotipe berlainan dalam satu spesies menghasilkan keturunan F1 melebihi keduatetuanya. Nilai heterosis dapat bertanda negatif atau positif. Tanda positif menunjukkan adanya peningkatan; sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya penurunan suatu sifat dibanding tetua (salah satu atau keduatetua). Tujuan perbaikan sifat adalah agar galur-galur hasil persilangan memiliki sudut daun lebih kecil, daya hasil sama atau lebih tinggi dibanding P8IS serta umur panen tetapanjah. Sudut daun lebih besar diperoleh pada P8IS, sehingga nilai negatif yang diinginkan. Demikian pula umur panen karena keduatetua umur panennya lebih dalam. Daya hasil persilangan P8IS vs NK212, diharapkan bertanda positif karena daya hasil P8IS lebih tinggi sedangkan persilangan P8IS vs NK7328, diharapkan bertanda positif atau negative; namun rata-rata tidak lebih rendah dibanding P8IS karena daya hasil NK7328 lebih tinggi.

Hasil evaluasi menunjukkan, sembilan galur memiliki nilai heterosis sudut daun bertanda positif dan tergolong rendah kecuai galur tergolong sedang. Satu galur bertanda negatif tergolong rendah untuk persilangan P8IS vs NK212 (Tabel 4). Hal ini berarti, perubahan sifat sudut daun kecil. Hal ini terlihat pada rata-rata sudut daun persilangan tersebut sama antara semua galur dengan keduatetua (Tabel 2). Berlainan dengan perubahan sudut daun yang terjadi pada persilangan P8IS vs NK3728. Sebagian besar bertanda negatif; berarti terjadi perubahan sudut daun ke arah lebih kecil. Satu hasil persilangan, yakni resiproknomor 13 memiliki heterosis tergolong tinggi bertanda negatif, menunjukkan penurunan yang besar. Pada Tabel 3 juga terlihat, bahwa galur tersebut memiliki sudut daun samadengantetua hibrida dan lebih kecil dibanding P8IS. Beberapa Galur F1 yang heterosis tergolong sedang bertanda negatif,

menunjukkan sudut daun samadengan tetua hibrida dan tetua P8IS. Keeratan hubungan nilai heterosis dengan rata-rata sifat sudut daun bersifat negatif sebesar  $-0.34$  dan tergolong lemah (Tabel 7); menunjukkan nilai heterosis semakin tinggi, maka penurunan sudut daun tidak terlalu besar.

Umur panen seluruh galur F1 hasil kedua macam persilangan, memiliki nilai heterosis bertanda negatif; menunjukkan terjadi perubahan ke arah lebih genjah. Keeratan hubungan nilai heterosis umur panen sebesar  $-0.80$  tergolong kuat (Tabel 7); berarti peningkatan nilai heterosis besar pengaruhnya terhadap penurunan umur panen. Hal ini terlihat pada rata-rata umur panen galur-galur F1 hasil kedua macam persilangan, berubah secara nyata lebih genjah dibanding tetua hibrida dan banyak pula yang samadengan umur panen P8IS. Empat galur memiliki umur panen super genjah, yaitu dua galur hasil persilangan P8IS vs NK212, yaitu (Tabel 3) dan nomor 11 dan 12 hasil persilangan P8IS vs NK7328 (Tabel 4) dan nilai heterosisnya tergolong sedang. Nilai heterosis galur-galur lain ada juga yang tergolong sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai heterosis setiap galur F1. Amzeri (2015) memperoleh hasil sama, bahwa nilai heterosis untuk umur panen pada beberapa hasil persilangan pada jagung Madura berbeda-beda.

Nilai heterosis daya hasil galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK212 seluruhnya bertanda positif; menunjukkan adanya peningkatan daya hasil dibanding tetua P8IS. Hal sama diperoleh oleh Setyowidianto, et al. (2017), bahwa hasil jagung memiliki nilai heterosis yang positif. Seluruh galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK7328 menunjukkan bertanda negatif; berarti terjadi penurunan daya hasil dibanding daya hasil NK7328. Seberapa besar pengaruh kenaikan/penurunan nilai heterosis terhadap rata-rata daya hasil dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi. Pada Tabel 7 terlihat bahwa nilai koefisien korelasinya sebesar  $-0.50$  dan tergolong sedang; berarti nilai heterosis cukup berpengaruh terhadap kenaikan daya hasil. Hal ini terlihat dari rata-rata daya hasil kedua macam persilangan tidak berbeda dengan masing-masing kedua tetua; walaupun terjadi perubahan nilai heterosis. Irianiet al. (2011) juga memperoleh bahwa nilai heterosis hasil jagung bertanda positif dan negatif. Perbedaan respon heterosis pada hibrida sangat dipengaruhi oleh latar belakang genetik dari tetua atau populasi awal pembentuk tetua (Abuali et al., 2012).

Penyebab terjadinya heterosis dapat dijelaskan dari hipotesis dominan dan dominan lebih. Dalam hipotesis dominan, dijelaskan akumulasi gen-gen dominan yang lebih baik dalam satu genotip menyebabkan munculnya fenomena heterosis; sedangkan penampilan gen-gen resesif akan tertutup atau hilang. Hipotesis dominan lebih menjelaskan, bahwa heterosis merupakan penampilan superioritas heterosis terhadap homosis. Hal ini berarti, individu yang memiliki pasangan alel dalam bentuk heterosis goter banyak, maka individu tersebut memiliki sifat lebih baik kedua tetua (Takdir, et al., 2010).

### **3. Kajian efek maternal**

Pewarisan karakter dari tetua kepada keturunannya dapat terjadi dalam 2 (dua) mekanisme, yaitu pewarisan kromosomal (nukleus) dan pewarisan ekstrakromosomal. Pewarisan ekstrakromosomal adalah pewarisan yang dikendalikan oleh gen yang ada di luar inti sel. Salah

satuciripewarisaniniyaituketurunanhasilpersilanganberbedadenganketurunanhasilpersilanganresiproknya (Syukur, *et.al.*, 2015). Implikasinyaadalahapabilaadaefek maternal, makauntukmemindahkansifat tersebutmelaluihibridisasi, makapopulasitersebutdigunakansebagaitetuaetina.

Hasil analisismenunjukkan, bahwasudutdaun, umurpanen dan dayahasilmenunjukkantidakadaefek maternal. Nilai efek maternal yang diperolehumurpanenhampirsamauntukkeduamacampersilangan, yaitu 7.33 % untukpersilangan P8IS vs NK212 dan 7.19 % untukpersilangan P8IS vs Nk7328. Efek maternal umurpanen 8.24 % untukpersilangan P8IS vs NK212 dan 3.57 % untukpersilangan P8IS vs Nk3728; sedangkandayahasilhampirsamauntukkeduamacampersilangantersebut. Hal iniberarti, ketigasisfatersebutdikendalikan oleh gen-gen dalam inti. Kontribusi gen-gen dalamsitoplasmaterhadappemilanketigasisfatersebut sangat kecil. Hal samadiperoleh oleh Pamandangan dan Bartholomeus (2018) untuksifatkomponenhasil (beratongkol, panjangongkol, diameter tongkol dan jumlahbiji per tongkol).


### KESIMPULAN

Rata-rata sudutdaungalur F1 hasilpersilangan dan resiprok P8IS vs NK212 samadengankeduatetua; sedangkanpersilangan P8IS vs NK7328 berbeda. Resiprokpersilangannomor 13 (P8IS vs Nk7328 (R13) memilikisudutdaunlebihkecildibanding P8IS dan samadengansudutdaun NK7328. Umurpanen super genjahdiperoleh pada hasilpersilangan P8IS vNK212 nomor 1, 5, persilangan P8IS vs NK3728 nomor 11 dan 12. Daya hasilantargalur F1 keduamacampersilangansamadengan masing-masing keduatetua; namunterjadikecendrunganaikandayahasil dibanding P8IS untuksebagianbesargalur F1. Terjadiperubahansifat sudutdaun, umurpanen dan dayahasilgalur F1 dibanding salah satutetua terbaikedengannilai heterosis bersifatnegatif dan positifdenganvariasidari 0.00 hingga 65.70 persen. Ketigasisfat pada keduamacampersilanganmenunjukkantidakadaefek maternal. Sudutdaun yang lebihkecil, umurpanentetap super genjah dan dayahasillebih tinggi, sangat dimungkirandiperoleh pada galur-galurkeduamacampersilangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andrade F H, Calviño P, Cirilo A and Barbieri P. 2002. *Agron. J.* 94: 975-980.
- Abuali, A.I., A.A. Abdelmulla, M.M. Khalafalla, A.E. Idris and A.M. Osman. 2012. Combining ability and heterosis for yield and yield component in maize (*Zea mays* L.). *Aust. J. Basic Appl. Sci.* 6:36-41.
- Amzeri, A. 2015. Evaluasi Nilai Heterosis dan Heterobeltiosis Pada PersilanganDialelTanamanJagung Madura (*Zea mays* L). *Agrosain* vol 3 (2):286-295.
- Anonymous. 2009. Metode Pembentukan Keragaman Genetik. <http://pttipb.wordpress.com/category/04-pembentukan-keragaman-genetik-dan-pengujiannya/41-metode-pembentukan-keragaman-genetik/> (Diakses, 19 Januari 2019).
- Badan LitbangPertanian dan Balitsereal. 2015. PenggunaanBenihJagungUmurGenjahMerupakan Upaya untukMeminimalkanKegagalan

- Panen. <http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/10038> (Diakses, 25 September 2019).
- Indriani, F.C. dan Mejaya. 2012. Toleransi Genotipe Jagung Biji Putih terhadap Cekaman Kekeringan. Hal. 411 – 420. *Prosiding Seminar Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Iriany, R. N. , S. Sujiprihati, M. Syukur, J. Koswara, dan M. Yunus. 2011. Evaluasi Daya Gabung dan Heterosis Lima Galur Jagung Manis (*Zea mays* var. *saccharata*) Hasil Persilangan Dialel. *J. Agron. Indonesia* 39 (2): 103 – 111.
- Jaya, I K D., Sudirman and Sudika, I W. 2019. Light interception and yield of some maize varieties grown in a double row pattern under different urea applications. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 346: 1-6.
- Lupi, C. 1995. Genetic Engineering for Plant Protection Methods, State of the Art and Applications. [http://www.bats.ch/bats/publikationen/1995-1\\_TA2-methods.php?lang\\_select=de](http://www.bats.ch/bats/publikationen/1995-1_TA2-methods.php?lang_select=de) (Diakses, 19 Januari 2019).
- Pamandungan, Y. dan T. Bartholomeus O. 2018. Pewarisan Sifat Warna Dan Tipe Biji Jagung Manado Kuning. *Eugenia* vol 24 (1): 1-8.
- Setyowidianto, E.P., Basuki, N. dan Damanhuri. 2017. Daya Gabung dan Heterosis Galur Jagung (*Zea mays* L.) pada Karakter Hasil dan Komponen Hasil. *J. Agron. Indonesia* 45(2):124-129.
- Somantri A., Muhidin S.A. 2006. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sudika, I W., Arya Parwata dan Soemeinaboedhy. 2019a. Response seleksi massa dengan pengendalian dan tanpa pengendalian penyerbukan terhadap daya hasil tanaman jagung di lahan kering. *Prosiding Seminar Pertanian Ke-VI dan Lokakarya Nasional. FKPTPI*. Hal.: 31-41.
- Sudika, I W., Arya Parwata dan Soemeinaboedhy. 2019b. Seleksi Massa Guna Memperoleh Varietas Unggul Jagung Tahan Kering, Umur Panen Super Genjah, Hasil Dan Brangkasan Segar Tinggi. Laporan Hasil Penelitian (Tidak dipublikasi). Universitas Mataram, Mataram.
- Sudika, I W. 2016. Kajian potensi hasil, ketahanan cekaman kekeringan dan umur panen hasil Hibridisasi pada tanaman jagung (*Zea mays* L.) Di lahan kering. (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Suherman dan Awaludin. 2007. *Budidaya Jagung Manis (Zea Mays Saccharata Sturt)*, Bahan Kursus Budidaya Jagung Manis dan Jagung Merang, Fakultas Pertanian IPB. Bogor
- Syukur, M., S. Sastrosumarjo, Y. Wahyu, S.I. Aisyah, S. Sujiprihati, dan R. Yuniarti. 2015. *Sitogenetika Tanaman*. IPB Press. Bogor.
- Takdir, A.M., S. Sunarti dan M.J. Mejaya. 2010. Pembentukan Varietas Jagung Hibrida. Hal. 74 – 95. *Dalam Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan*. Litbang Deptan.







## **Perbaikan Sudut Daun Populasi Komposit Tanaman Jagung Melalui Hibridisasi dengan Varietas Hibrida**

### *Leaf Angle Improvement of Corn Composite Population Through Hybridization with Hybrid Varieties*

**I Wayan Sudika<sup>\*</sup>, Dwi Ratna Anugrahwati**

Program Studi Agroekoteknologi, Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram

*\*Corresponding Author Email: sudikawayanms@gmail.com*

Manuscript received: 08-12-2020. Accepted: 05-04-2021

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata sudut daun, umur panen dan daya hasil F1 hasil persilangan komposit dengan hibrida; nilai heterosis dan mengetahui efek maternal ketiga sifat tersebut pada tanaman jagung. Percobaan telah dilaksanakan di lahan sawah irigasi teknis mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok, dua ulangan dan perlakuannya sebanyak 28 F1. Data hasil percobaan dianalisis dengan analisis sidik ragam dan diuji lanjut dengan uji BNT pada taraf nyata 5 persen. Nilai heterosis dihitung atas dasar tetua yang nilainya lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata sudut daun galur F1 hasil persilangan dan resiprok P8IS vs NK212 sama dengan kedua tetua; sedangkan persilangan P8IS vs NK7328 berbeda. Resiprok persilangan nomor 13 (P8IS vs Nk7328 (R13) memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS dan sama dengan sudut daun NK7328. Umur panen super genjah diperoleh pada hasil persilangan P8IS vs NK212 nomor 1, 5; persilangan P8IS vs NK3728 nomor 11 dan 12. Daya hasil antar galur F1 kedua macam persilangan sama dengan masing-masing kedua tetua; namun terjadi kecenderungan kenaikan daya hasil dibanding P8IS untuk sebagian besar galur F1. Terjadi perubahan sifat sudut daun, umur panen dan daya hasil galur F1 dibanding salah satu tetua terbaik dengan nilai heterosis bersifat negatif dan positif dengan variasi dari 0.00 hingga 65.70 persen. Ketiga sifat pada kedua macam persilangan tidak menunjukkan efek maternal. Sudut daun yang lebih kecil, umur panen tetap super genjah dan daya hasil lebih tinggi, sangat dimungkinkan diperoleh pada galur-galur kedua macam persilangan.

Keywords: Daya hasil, heterosis, efek maternal, sudut daun dan umur panen

#### **Abstract**

This study aims to determine the average leaf angle, harvest age and yield of F1 from cross-hybrid composite; heterosis value and knowing the maternal effect of these three traits on maize. The experiment was carried out in technically irrigated rice fields from November 2019 to February 2020. The design used in this experiment was a randomized block design, two replications and The treatment was 28 F1. The experimental data were analyzed by means of analysis of variance and further tested with the LSD test at the 5 percent level. Heterosis values were calculated on the basis of

the parents whose scores were higher (High Parent Heterosis). The results showed that the mean leaf angles of F1 lines from crosses and reciprocal P8IS vs NK212 were the same as the two parents; whereas the P8IS vs NK7328 cross is different. The reciprocal of cross number 13 (P8IS vs Nk7328 /R13) has smaller leaf angle than P8IS and is the same as the leaf angle of NK7328. The yield of the F1 lines from the two types of crosses was the same as each of the two parents; however, there was a tendency for an increase in yield compared to P8IS for most of the F1 lines. There was a change in leaf angle properties, harvest age and yield of F1 lines compared to one of the best parents with heterosis values are negative and positive with variations from 0.00 to 65.70 percent. Coefficient of correlation between heterosis with the average value of traits was classified as strong for the harvest age; moderate for yield and weak for leaf angle. These three traits in the two types of crosses showed no maternal effects. Smaller leaf angle, super early harvest age and higher yield, are possible to be obtained from the lines of both crosses.

Keywords: yield, heterosis, maternal effect, leaf angle and harvest age.

## PENDAHULUAN

Sekitar 60 persen penanaman jagung di Indonesia dilakukan di lahan kering, sehingga sangat diperlukan varietas yang tahan terhadap cekaman kekeringan (Indriani dan Mejaya, 2012).

Varietas unggul merupakan salah satu faktor penting dalam usaha meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Selanjutnya Suherman dan Awaludin (2007) mengatakan benih jagung bermutu yang murni dari varietas jagung komposit dapat menjaminkan tercapainya produktivitas tinggi. Salah satu faktor penentu produktivitas adalah populasi. Populasi yang optimum untuk menghasilkan produktivitas maksimal tergantung dari kondisi tanah dan iklim setempat, yakni cahaya yang diteruskan sekitar 95 persen (Andrade *et al.*, 2002). Salah satu penentu populasi optimum adalah sudut daun.

Populasi P8IS merupakan populasi hasil seleksi yang memiliki daya hasil lebih tinggi dibandingkan varietas unggul (Gumarang) Populasi ini memiliki umur panen super genjah di lahan kering dan sudut daun yang lebar (Sudika, *et al.*, 2019). Peningkatan daya hasil masih dapat dilakukan dengan memperbaiki sudut daun, yakni lebih kecil. Sudut daun yang lebih kecil menunjukkan daun-daun lebih tegak, sehingga lebih efektif memanfaatkan cahaya matahari dan dapat ditanam lebih rapat. Disisi lain, varietas hibrida beredar sekarang termasuk hibrida komersial dengan sudut daun kecil. Hasil pengamatan pendahuluan, bahwa sudut daun P8IS berkisar 50 – 60°; sedangkan hibrida NK212 rata-rata 33,100, dan NK7328, 31,250. Berdasarkan data tersebut, maka telah dilakukan P8IS dengan Hibrida NK212 dan NK7328 dengan tujuan untuk memperoleh galur yang memiliki sudut daun dengan umur panen tetap super genjah dan hasil minimal sama dengan P8IS.

Untuk memperoleh keturunan yang memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS, umur panen genjah/super genjah dan daya hasil tinggi, maka telah dilakukan hibridisasi secara resiprok dan dihasilkan sejumlah F1. Galur-galur F1 ini telah dievaluasi untuk memberikan gambaran terhadap terjadinya kombinasi sifat-sifat pada F1 tersebut, sekaligus dapat dikaji heterosis dan efek maternal sifat kuantitatifnya.

## BAHAN DAN METODE

### Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah galur-galur F1 sebanyak 28 Galur dengan rincian hasil persilangan P8IS vs hibrida NK212 sebanyak 10 dan hasil persilangan P8IS vs NK7328 sebanyak 18 galur, P8IS, NK212 dan NK7328. Bahan-

bahan lain, yaitu pupuk Phonska Urea dan pupuk organik Petroganik serta pestisida (Calaris 550 SC, Furadan 3G dan Saromyl 35 SD).

### **Metode Penelitian dan Rancangan Percobaan**

Metode eksperimental digunakan dalam penelitian ini dengan percobaan di lahan sawah irigasi teknik, yakni di lahan praktek Fakultas Pertanian di desa Lembuak Lombok Barat. Percobaan dimulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Ketinggian tempat sekitar 250 m dpl. Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan acak kelompok dengan dua ulangan. Jumlah perlakuan sebanyak 31 genotipe, yaitu 28 galur F1 hasil persilangan dan resiproknya serta 3 tetua.

### **Pelaksanaan**

Persiapan lahan meliputi pengolahan tanah, pembuatan blok-blok dan saluran irigasi. Pengolahan tanah, dilakukan dengan membajak dan menggaru masing-masing satu kali menggunakan hand traktor. Tanah yang telah diolah pada petak percobaan, kemudian diratakan. Selanjutnya petak percobaan dibagi dua; masing-masing dengan ukuran 52,8 x 4 m. Setiap bagian merupakan satu blok. Jarak antar blok 1 m dan dibuat saluran selebar 40 cm. Pada sekeliling petakan juga dibuat saluran irigasi untuk memperlancar pembuangan air hujan.

Benih jagung yang digunakan terlebih dahulu diberi Saromyl 35 SD dengan dosis sebanyak 5 g/1. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit bulai. Penanaman dilakukan dengan menggunakan jarak tanam 20 x 60 cm. Setiap perlakuan terdapat dua baris dalam satu baris ditanam 20 tanaman. Pembuatan lubang tanam, dilakukan dengan menggunakan tugal sedalam sekitar 5 cm. Jumlah benih per lubang sebanyak 1 biji. Pada setiap lubang tanam diisi Furadan 3G dengan dosis 20 kg/ha. Selanjutnya lubang tanam ditutup dengan pupuk organik Petroganik dengan dosis 500 kg/ha.

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk Phonska dosis 300 kg/ha dan 200 kg/ha Urea yang diberikan 2 kali. Pemupukan pertama diberikan pupuk Phonska dengan dosis 150 kg/ha saat tanam ditambah 100 kg/ha Urea. Pemupukan kedua pada umur 30 hari setelah tanam pupuk Phonska dengan dosis 150 kg/ha dan 100 kg/ha pupuk Urea. Pupuk diberikan dengan cara ditugal kedalaman 9-10 cm disamping tanaman dan ditutup tanah.

Pengairan aman jagung bersumber dari air irigasi teknis. Pengairan dilakukan dengan cara di labyakni petak dan di air hingga air rata dengan tanah kemudian air dibiarkan hingga meresap ke dalam tanah. Pengairan dilakukan pada umur 10 hari dan 24 hari setelah tanam. Pengairan selanjutnya tidak dilakukan karena turun hujan.

Penyulaman dilakukan pada 10 hari setelah tanam dengan memindahkan tanaman cadangan yang ditanam di antar barisan di dalam plot. Pengendalian gulma dilakukan dengan menggunakan herbisida Calaris. Penyemprotan dilakukan pada umur 15 hari setelah tanam. Konsentrasi yang digunakan adalah 75 cc/16 liter air (3 cc/liter air).

Pembumunan aman jagung dilakukan 1 minggu setelah penyemprotan Calaris dengan cara mencangkul tanah di antar barisan tanaman, kemudian tanah tersebut ditempatkan pada barisan tanaman di sebelah kiri dan kanan.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman jagung yaitu dengan menggunakan Furadan 3G yang diberikan pada lubang tanam pada saat tanam. Pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung menggunakan saromyl 35 SD. Pengendalian hama dan penyakit berikut tidak dilakukan karena tidak ada serangan hama dan penyakit pada percobaan. Panen dilakukan apabila tanaman telah menunjukkan kriteria panen, yaitu kelobot dan rambuttong kol telah kering dan bijit telah mengeras apabila ditekan dengan kuku tidak berbekas.

**Variabel Yang Diamati dan Analisis Data**

Variabel yang diamati meliputi sudut dan, umur panen dan daya hasil. Sudut diamati pada fase pengisian biji. Umur panen, diperoleh dengan menghitung hari sejak tanam hingga 85 persen tanaman setiap plot telah siap panen. Daya hasil diukur dari bobot biji kering pipil per tanaman.

Data hasil percobaan dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 persen. Apabila F hitung perlakuan lebih besar dibanding F tabel, maka dilakukan uji lanjut dengan uji bedanya terkecil (BNT) pada taraf nyata 5 persen.

Nilai heterosis diperoleh, dengan rumus sebagai berikut (Ujiyanto, *et al.*, 2020).

**HPH**

Keterangan :

F1 = Rerata penampilan suatu galur.

HP = Rerata penampilan tetua tertinggi.

Selanjutnya, dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi didasarkan atas nilai heterosis yang diperoleh.

Nilai efek maternal diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$ME (\%) = (Gx - Gy) / Gy \times 100$$

Dengan

ME = nilai efek maternal

Gx = galur hasil persilangan/resiproknya dengan nilai lebih tinggi

Gy = galur hasil persilangan/resiproknya dengan nilai lebih rendah.

Uji t pada taraf nyata 5 persen, digunakan untuk mengetahui nyata/ tidaknya maternal efek suatu sifat.

Korelasi antara heterosis dengan rata-rata setiap sifat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Tingkat keeratan hubungan antar variabel ditetapkan dengan mengikuti kriteria Guilford (1956 *cit.* Somantri & Muhidin, 2006), seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat keeratan hubungan antar variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi (r)

Kisaran Nilai Koefisien Korelasi (r)		Katagori
Bertanda positif	Bertanda negatif	
0.00 < r < 0.20	-0.20 < r ≤ 0.00	Sangat Lemah
0.20 ≤ r < 0.40	-0.40 < r ≤ - 0.20	Lemah

$0.40 \leq r < 0.70$	$-0.70 < r \leq -0.40$	Sedang
$0.70 \leq r < 0.90$	$-0.90 < r \leq -0.70$	Kuat
$0.90 \leq r < 1.00$	$-1.00 < r \leq -0.90$	Sangat Kuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Nilai rerata setiap sifat pada persilangan P8IS vs Nk 212 disajikan pada Tabel 2 dan untuk persilangan P8IS vs NK7328 disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 4 dan Tabel 5, disajikan berturut-turut untuk nilai heterosis setiap galur untuk persilangan P8IS vs NK212 dan P8IS vs NK7328. Pada Tabel 6, disajikan nilai efek maternal dan Tabel 7 disajikan keeratan hubungan nilai heterosis dengan rata-rata sifat.

Tabel 2. Rerata tiga sifat untuk galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Sifat-sifat yang diamati *)		
		Sudut daun ( $^{\circ}$ )	Umur panen (hari)	Daya hasil ( $g\ tan^{-1}$ )
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (1)	53.75	78.00 a	99.38
2	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R1)	55.63	91.00 bc	74.75
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (2)	53.75	85.00 a	73.19
4	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R2)	54.38	86.00 a	70.88
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (3)	52.25	78.00 a	95.13
6	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R3)	54.00	98.00 ac	101.75
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (4)	55.25	82.00 a	89.00
8	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R4)	55.63	88.00 a	85.49
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (5)	47.50	85.00 a	84.75
10	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R5)	62.13	90.00 b	75.25
11	Tetua NK212	49.50	95.00 c	58.38
12	Tetua P8IS	51.88	79.00 a	71.63
Nilai BNT <sub>0.05</sub>		-	9.11	-

Keterangan: \*) Angka-angka pada kolom samadikuti oleh huruf samatidakberbedanyatadengan uji BNT<sub>0.05</sub>

Pada Tabel 2 ditunjukkan, bahwa seluruh galur hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya masing-masing, memiliki sudut daun samadengankeduatetua. Hal ini didasarkan atas analisis ragam, bahwa perlakuan tidak berbedanyata. Galur resiprok hasil persilangan nomor 1 dan nomor 5 memiliki umur panen lebih dalam dibanding tetua P8IS. Galur hasil persilangan lain dan resiproknya, memiliki umur panen samadengan P8IS; namun terdapat dua galur yang memiliki umur panen super genjah (< 80 hari), yaitu persilangan nomor 1 dan nomor 3. Berdasarkan hasil analisis ragam, bahwa daya hasil perlakuan tidak berbedanyata; berarti targa galur hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya masing-masing samadengankeduatetua.

Tabel 3. Rerata tigasifat yang diamati pada galur hasil persilangan P8IS vs NK7328 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Sifat-sifat yang diamati *)		
		Sudut daun (°)	Umur panen (hari)	Daya hasil (g tan <sup>-1</sup> )
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (6)	49.38 b	83.50 a	85.63
2	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R6)	46.75 bc	94.50 bc	74.38
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (7)	61.63 b	88.00 b	66.00
4	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R7)	48.13 b	98.00 bc	71.25
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (8)	40.63 bc	98.00 bc	87.50
6	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R8)	47.25 bc	94.50 bc	46.50
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (9)	59.38 b	88.00 b	78.88
8	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R9)	56.00 b	88.00 b	93.63
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (10)	58.75 b	91.50 bc	91.00
10	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R10)	58.75 b	98.00 bc	73.00
11	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (11)	51.88 b	78.50 a	95.63
12	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R11)	53.13 b	86.50 a	92.75
13	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (12)	48.75 b	79.00 a	87.25
14	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R12)	41.00 bc	85.00 a	70.00
15	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (13)	49.25 b	91.50 bc	86.90
16	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R13)	34.50 c	85.00 b	74.00
17	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (14)	51.88 b	98.00 bc	38.38
18	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R14)	54.38 b	94.50 bc	70.13
19	Tetua NK7328	34.38 c	98.00 c	111.88
20	Tetua P8IS	51.88 b	79.00 a	71.63
Nilai BNT <sub>0.05</sub>		13.59	8.64	-

Keterangan: \*) Angka-angka pada kolom samadikuti oleh huruf samatidakberbedanyatadengan uji BNT<sub>0.05</sub>.

Pada Tabel 3 terlihat, bahwagalur resiprok persilangan P8IS vs NK7328 nomor 13 memiliki sudut daun lebih kecil dibanding sudut daun P8IS dan samadengan sudut daun tetua hibridanya. Rata-rata sudut daun yang samadengan tetua hibrida dan juga samadengan tetua P8IS, yaitu resiprok nomor 6; hasil persilangan nomor 8 dan resiproknya dan resiprok nomor 12. Umur panen hasil persilangan nomor 6; hasil persilangan nomor 11 dan 12 serta resiprok persilangan nomor 11 dan 12 samadengan P8IS; sedang galur lainnyalebih dalam. Galur yang umur panennyatergolong super genjah, yaitu hasil persilangan nomor 11 dan nomor 12. Daya hasil semuagalur samadengandayahasilkeduatetua.

Tabel 4. Nilai heterosis (%) tigasifat setiagalur hasil persilangan P8IS vs NK212 dan resiproknya

Nilai heterosis (%) setiapsifat yang diamati	
--	--

No.	Galur/Tetua	Sudut daun (°)	Kategori	Umur panen (hari)	Kategori	Daya hasil (g tan <sup>-1</sup> )	Kategori
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (1)	3.61	Rendah	-17.89	Sedang	38.73	Tinggi
2	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R1)	7.23	Rendah	-4.21	Rendah	4.36	Rendah
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (2)	3.61	Rendah	-12.11	Sedang	2.17	Rendah
4	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R2)	4.82	Rendah	-10.00	Rendah	-1.05	Rendah
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (3)	0.72	Rendah	-17.89	Sedang	32.80	Tinggi
6	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R3)	4.10	Rendah	-7.37	Rendah	42.05	Tinggi
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (4)	6.51	Rendah	-13.68	Sedang	24.25	Tinggi
8	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R4)	7.23	Rendah	-10.53	Rendah	19.34	Sedang
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK212 (5)	-8.44	Rendah	-10.53	Rendah	18.32	Sedang
10	Hasil resiprok P8IS x NK212 (R5)	19.75	Sedang	-4.74	Rendah	5.05	Rendah
	Rata-rata	4.91		-10.89		18.60	

Atas dasar nilai heterosis yang diperoleh, dibuat kategori rendah, sedang dan tinggi. Kategori rendah: 0.00-11.17/-11.17-0.00; sedang 11.18-22.35/-22.35 - -11.18 dan tinggi; > 22.35/<-22.35. Heterosis sudut daun dan daya hasil pada Tabel 4, diukur dari tetua P8IS karena nilai P8IS untuk kedua sifat tersebut lebih tinggi; sedangkan umur panen dihitung dari tetua NK212. Nilai heterosis sudut daun yang semakin tinggi dengan tanda negatif, menunjukkan semakin tinggi berkurangnya sudut daun dibandingkan sudut daun P8IS. Umur panen yang nilai heterosis semakin tinggi dengan tanda negatif, menunjukkan semakin besar berkurangnya umur panen dibandingkan tetua NK212. Daya hasil yang semakin tinggi nilai heterosisnya dengan tanda positif; berarti semakin besar peningkatan daya hasil dibandingkan P8IS. Berdasarkan Tabel 4, bahwa hasil persilangan nomor 5 memiliki nilai heterosis negatif; berarti galur tersebut memiliki sudut daun cenderung lebih kecil dibandingkan sudut daun P8IS. Nilai heterosis umur panen seluruhnya negatif; berarti semua galur lebih tua dibandingkan umur panen NK212. Nilai heterosis -17.89 % (Tabel 4). Daya hasil seluruh galur memiliki nilai heterosis positif; berarti terjadi peningkatan daya hasil dibandingkan P8IS, kecuali galur resiprok hasil persilangan nomor 2 memiliki nilai negatif;

berarti terjadi penurunan daya hasil. Rata-rata nilai heterosis daya hasil lebih tinggi dibandingkan sudut daun dan umur panen. Heterosis sudut daun seluruh persilangan tergolong rendah, kecuali resiprok nomor 5, tergolong sedang. Umur panen memiliki heterosis tergolong rendah dan sedang berturut-turut sebanyak 6 dan 4. Heterosis daya hasil tergolong tinggi sebanyak 4 galur; sedang, 2 dan rendah, 4 galur.

Tabel 5. Nilai heterosis (%) tiap sifat setiap galur hasil persilangan P8IS vs NK7328 dan resiproknya

No.	Galur/Tetua	Nilai heterosis (%) setiap sifat yang diamati					
		Sudut daun	Kategori	Umur panen	Kategori	Daya hasil	Kategori
1	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (6)	-4.83	Rendah	-14.80	Sedang	-23.47	Tinggi
2	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R6)	-9.89	Rendah	-3.57	Rendah	-33.52	Tinggi
3	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (7)	18.78	Sedang	-10.20	Rendah	-41.01	Tinggi
4	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R7)	-7.24	Rendah	0	Rendah	-36.32	Tinggi
5	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (8)	<b>-21.69</b>	Sedang	0	Rendah	-21.79	Sedang
6	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R8)	-8.92	Rendah	-3.57	Rendah	-58.44	Tinggi
7	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (9)	14.45	Sedang	-10.20	Rendah	-29.50	Tinggi
8	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R9)	7.94	Rendah	-10.20	Rendah	-16.32	Sedang
9	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (10)	13.24	Sedang	-6.63	Rendah	-18.66	Sedang
10	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R10)	13.24	Sedang	0.00	Rendah	-34.75	Tinggi
11	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (11)	-0.01	Rendah	-19.90	Sedang	-14.53	Sedang
12	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R11)	2.40	Rendah	-11.73	Rendah	-17.10	Sedang
13	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (12)	-6.03	Rendah	-19.39	Sedang	-22.01	Tinggi
14	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R12)	<b>-20.97</b>	Sedang	-13.27	Sedang	-37.43	Tinggi
15	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (13)	-5.07	Rendah	-6.63	Rendah	-22.33	Tinggi



16	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R13)	-33.50	Tinggi	-10.20	Rendah	-33.86	Tinggi
17	Hasil F <sub>1</sub> P8IS x NK7328 (14)	-0.01	Rendah	0.00	Rendah	-65.70	Tinggi
18	Hasil resiprok P8IS x NK7328 (R14)	4.81	Rendah	-3.57	Rendah	-37.32	Tinggi
	Rata-rata	-2.41		-7.99		-31.34	

Pada Tabel 5, nilai heterosis umurpanen dan dayahasildidasarkanatas NK7328 karenanilainyalebihtinggidibanding P8IS; sedangkansudutdaunatasdasar P8IS. Sebanyak 11 galurmemilikinilai heterosis sudutdaunnegatif; berartigalurtersebutsudutdaunnyalebihkecildibanding P8IS. dan sisanyapositif. Empatgalurmemilikinilai heterosis nol; berartiumurpanensamadengantetua NK7328; galurlainnyabernilainegatif; berartiumurpanennyalebihgenjahdibandingtetua NK7328. Pada Tabel 5 juga terlihat, bahwanilai heterosis dayahasilseluruhnyanegatif; berartiseluruhgalurdayahasilnyalebihrendahdibanding NK7328. Nilai heterosis dayahasillebihtinggidibandingnilai heterosis sudutdaun dan umurpanen. Sebagian besargalurmemilikinilai heterosis sudutdauntergolongrendah, yakni 11 galur; tergolongtingghanyasatugalur, yakniresiprokpersilangannomor 13 dan sisanyatergolongsedang, yaknisebanyak 6 galur. Heterosis umurpanentergolongrendahsebanyak 4 galur; sedang 14 galur dan tidakada yang tergolongtinggi. Sebanyak 13 galuruntukdayahasilmemilikinilai heterosis tergolongtinggi; 5 galurtergolongsedang dan tidakadagalur yang tergolongrendah.

Tabel 6. Nilai maternal efek (%) tigasifat yang diamatiuntuksetiapmacampersilangan

No.	Macam persilangan	Nilai efek maternal (%)		
		Sudutdaun	Umurpanen	Daya hasil
1	Persilangan P8IS vs NK212	7.33 ns	8.12 ns	8.17 ns
2	Persilangan P8IS vs NK7328	7.19 ns	3.57 ns	7.74 ns

Pada Tabel 6 terlihat, bahwanilai maternal efeksudutdaun, umurpanen dan dayahasiluntukkeduamacampersilanganbersifattidaknyata. Hal iniberartitidakada maternal efekuntukketigasifattersebut.

Tabel 7. Nilai koefisienkorelasiantarnilai heterosis dengan rata-rata setiapsifat yang diamati

No.	Sifat yang diamati	Nilai koefisienkorelasi	Kriteria
1	Sudutdaun	-0.34	Lemah
2	Umurpanen	-0.80	Kuat
3	Daya hasil	-0.50	Sedang

Pada Tabel 7 terlihat, bahwasudutdaunmemilikinilaikoefisienkorelasitergolonglemah, yakni -0,34. Hal iniberartipeningkatannilai heterosis memberikankontribusi yang sangat sedikitterhadappenurunansudutdaun. Sebaliknya pada

sifat umur panen nilai koefisien korelasi sebesar 0.80 tergolong kuat. Semakin tinggi nilai heterosis, maka umur panen semakin rendah. Daya hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0.50 tergolong sedang; nilai heterosis semakin tinggi cukup besar pengaruhnya terhadap penurunan daya hasil.

## **Pembahasan**

### **1. Kajian perubahan rata-rata populasi akibat hibridisasi**

Hibridisasi bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter baik yang terdapat pada tanaman berbeda, menjadikannya genotipe baru. Hibridisasi dapat dilakukan dalam populasi maupun antar populasi (Anonymous, 2009 dan Lupi, 1995). Hasil

hibridisasi tersebut dapat diseleksi untuk mendapatkan genotipe unggul sesuai kombinasi karakter yang diinginkan. Populasi P8IS

merupakan populasi hasil rakitan kultivar lokal dengan varietas unggul komposit (Gumarang, Sukmaraga dan Lamuru); yang telah diseleksi selama 8 siklus dengan seleksi massal menggunakan teknik indeks seleksi dan dihasilkan komposit P8IS. Umur panen populasi ini tergolong super genjah, yakni < 80 hari (Sudika, *et al.*, 2019a). Kategori tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Balitbang dan Balit sereal (2015). Rata-rata daya hasil di lahan kering adalah 7.097 t/ha dan populasi ini tahan terhadap cekaman kekeringan (Sudika, *et al.*, 2019b). Disisi lain, sudut daun masih lebar, sehingga nampak daun agak terkulai. Hal

ini merupakan kelemahan sifat populasi P8IS.

Peningkatan sudut daun dapat dilakukan melalui hibridisasi dengan tetua yang memiliki sudut daun tergolong sempit. Varietas hibrida modern yang beredar, seperti NK212, NK7328, Bisi-18 dan Pioneer 21 umumnya memiliki sudut daun sempit, sehingga dapat ditanam pada jarak tanam yang lebih rapat (Jaya *et al.*, 2019). Hibrida juga memiliki potensi hasil lebih tinggi dibanding komposit (Takdir *et al.*, 2010). Dua keunggulan yang terdapat pada hibrida ini merupakan sifat yang ingin digabung dengan sifat umur panen super genjah dan tahan cekaman kekeringan yang ada pada P8IS. Penggabungan sifat-sifat unggul tersebut, telah dilakukan melalui hibridisasi secara resiprok menggunakan dua hibrida sebagai tetua, yaitu NK212 dan NK7328. Hasil hibridisasi tersebut berupa galur-galur F1.

Hasil evaluasi galur F1 menunjukkan, bahwa diperoleh satu galur yang memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS dan sama dengan tetua hibridanya, yakni galur resiprok persilangan P8IS vs NK7328 nomor 13. Tiga persilangan memiliki sudut daun sama dengan kedua tetua, yaitu resiprok persilangan nomor 6, 8 dan resiprok nomor 12. Persilangan P8IS vs NK212 menghasilkan seluruh galur F1 yang memiliki sudut daun sama dengan kedua tetua.

Umur panen super genjah diperoleh pada beberapa galur, yaitu hasil persilangan P8IS vs NK212 nomor 1 dan nomor 5 dan hasil persilangan P8IS vs NK7328 nomor 11 dan 12. Seluruh persilangan ini menggunakan P8IS sebagai tetua jantan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sudika (2016), bahwa gen umur super genjah dapat diwariskan dengan menggunakan populasi super genjah sebagai tetua jantan.

Daya hasil seluruh galur F1 sama dengan kedua tetua pada kedua macam persilangan. Kecenderungan kenaikan daya hasil dibanding kedua tetua, terjadi pada semua galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK212. Seluruh galur hasil persilangan P8IS vs NK7328, cenderung turun dibanding tetua hibrida; namun sebagian besar cenderung naik dibanding P8IS, kecuali resiprok nomor 7, 8 dan resiprok nomor 14.

Uraian di atas memberikan indikasi, bahwa hibridisasi dapat menghasilkan populasi dengan umur panen super genjah, sudut daun sempit dan daya hasil lebih tinggi dibanding P8IS. Masing-masing sifat yang diinginkan tersebut, tidak terdapat dalam satu galur; melainkan pada beberapa galur. Segregasi pada F<sub>2</sub>, akan menentukan galur-galur mana yang ditetapkan sebagai bahan untuk pembentukan populasi dasar, sehingga diperlukan evaluasi galur-galur F<sub>2</sub>.

## **2. Kajian heterosis**

Heterosis merupakan gejala, bahwa persilangan dua genotipe berbeda dalam satu spesies menghasilkan keturunan F<sub>1</sub> melebihi kedua tetuanya. Nilai heterosis dapat bertanda negatif atau positif. Tanda positif menunjukkan adanya peningkatan; sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya penurunan suatu sifat dibanding tetua (salah satu atau kedua tetua). Tujuan perbaikan sifat adalah agar galur-galur hasil persilangan memiliki sudut daun lebih kecil, daya hasil sama atau lebih tinggi dibanding P8IS serta umur panen tetap genjah. Sudut daun lebih besar diperoleh pada P8IS, sehingga nilai negatif yang diinginkan. Demikian pula umur panen karena kedua tetua umur panennya lebih dalam. Daya hasil persilangan P8IS vs NK212, diharapkan bertanda positif karena daya hasil P8IS lebih tinggi sedangkan persilangan P8IS vs NK7328, diharapkan bertanda positif atau negatif; namun rata-rata tidak lebih rendah dibanding P8IS karena daya hasil NK7328 lebih tinggi.

Hasil evaluasi menunjukkan, sembilan galur memiliki nilai heterosis sudut daun bertanda positif dan tergolong rendah kecuali galur tergolong sedang. Satu galur bertanda negatif tergolong rendah untuk persilangan P8IS vs NK212 (Tabel 4). Hal ini berarti, perubahan sifat sudut daun kecil. Hal ini terlihat pada rata-rata sudut daun persilangan tersebut sama antara semua galur dengan kedua tetua (Tabel 2). Berbeda dengan perubahan sudut daun yang terjadi pada persilangan P8IS vs NK3728. Sebagian besar bertanda negatif; berarti terjadi perubahan sudut daun ke arah lebih kecil. Satu hasil persilangan, yakni resiprok nomor 13 memiliki heterosis tergolong tinggi bertanda negatif, menunjukkan penurunan yang besar. Pada Tabel 3 juga terlihat, bahwa galur tersebut memiliki sudut daun sama dengan tetua hibrida dan lebih kecil dibanding P8IS. Beberapa Galur F<sub>1</sub> yang heterosis tergolong sedang dengan tanda negatif, menunjukkan sudut daun sama dengan tetua hibrida dan tetua P8IS. Keeratannya hubungan nilai heterosis dengan rata-rata sifat sudut daun bersifat negatif sebesar -0.34 dan tergolong lemah (Tabel 7); menunjukkan nilai heterosis semakin tinggi, maka penurunan sudut daun tidak terlalu besar.

Umur panen seluruh galur F<sub>1</sub> hasil kedua macam persilangan, memiliki nilai heterosis bertanda negatif; menunjukkan terjadi perubahan ke arah lebih genjah. Keeratannya hubungan nilai heterosis umur panen sebesar -0.80 tergolong kuat (Tabel 7); berarti peningkatan nilai heterosis

besar pengaruhnya terhadap penurunan umur panen. Hal ini terlihat pada rata-rata umur panen galur-galur F1 hasil kedua macam persilangan, berubah secara nyata lebih genjah dibanding tetua hibrida dan banyak pula yang sama dengan umur panen P8IS. Empat galur memiliki umur panen super genjah, yaitu dua galur hasil persilangan P8IS vs NK212, yaitu (Tabel 3) dan nomor 11 dan 12 hasil persilangan P8IS vs NK7328 (Tabel 4) dan nilai heterosisnya tergolong sedang. Nilai heterosis galur-galur lain ada juga yang tergolong sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai heterosis setiap galur F1. Amzeri (2015) memperoleh hasil sama, bahwa nilai heterosis untuk umur panen pada beberapa hasil persilangan pada jagung Madura berbeda-beda.

Nilai heterosis daya hasil galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK212 seluruhnya bertanda positif; menunjukkan adanya peningkatan daya hasil dibanding tetua P8IS. Hal sama diperoleh oleh Setyowidianto, et al. (2017), bahwa hasil jagung memiliki nilai heterosis yang positif. Seluruh galur F1 hasil persilangan P8IS vs NK7328 menunjukkan tanda negatif; berarti terjadi penurunan daya hasil dibanding daya hasil NK7328. Seberapa besar pengaruh kenaikan/penurunan nilai heterosis terhadap rata-rata daya hasil dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi. Pada Tabel 7 terlihat bahwa nilai koefisien korelasinya sebesar -0,50 dan tergolong sedang; berarti nilai heterosis cukup berpengaruh terhadap kenaikan daya hasil. Hal ini terlihat dari rata-rata daya hasil kedua macam persilangan tidak berbeda dengan masing-masing kedua tetua; walaupun terjadi perubahan nilai heterosis. Irianiet al. (2011) juga memperoleh bahwa nilai heterosis hasil jagung bertanda positif dan negatif. Perbedaan respon heterosis pada hibrida sangat dipengaruhi oleh latar belakang genetik dari tetuannya atau populasi awal pembentuk tetua (Abuali et al., 2012).

Penyebab terjadinya heterosis dapat dijelaskan dari hipotesis dominan dan dominan lebih. Dalam hipotesis dominan, dijelaskan akumulasi gen-gen dominan yang lebih baik dalam satu genotip menyebabkan munculnya fenomena heterosis; sedangkan penampilan gen-gen resesif akan tertutup atau hilang. Hipotesis dominan lebih menjelaskan, bahwa heterosis merupakan penampilan superioritas heterosigotis terhadap homosigotitas. Hal ini berarti, individu yang memiliki pasangan alel dalam bentuk heterosigotis terbanyak, maka individu tersebut memiliki sifat lebih baik dari tetua (Takdir, et al., 2010).

### **3. Kajian efek maternal**

Pewarisan karakter dari tetua kepada keturunannya dapat terjadi dalam 2 (dua) mekanisme, yaitu pewarisan kromosomal (nukleus) dan pewarisan ekstrakromosomal. Pewarisan ekstrakromosomal adalah pewarisan yang dikendalikan oleh gen yang ada di luar inti sel. Salah satu ciri pewarisan ini yaitu keturunan hasil persilangan berbeda dengan keturunan hasil persilangan resiprokalnya (Syukur, et al., 2015). Implikasinya adalah apabila ada efek maternal, maka untuk memindahkan sifat tersebut melalui hibridisasi, maka populasi tersebut digunakan sebagai tetua betina.

Hasil analisis menunjukkan, bahwa sudut daun, umur panen dan daya hasil menunjukkan tidak ada efek maternal. Nilai efek maternal yang diperoleh umur panen hampir sama untuk kedua macam persilangan, yaitu 7.33 %

untuk persilangan P8IS vs NK212 dan 7.19 % untuk persilangan P8IS vs Nk7328. Efek maternal umur panen 8.24 % untuk persilangan P8IS vs NK212 dan 3.57 % untuk persilangan P8IS vs Nk3728; sedangkan daya hasil hampir sama untuk kedua macam persilangan tersebut. Hal ini berarti, ketiga sifat tersebut dikendalikan oleh gen-gen dalam inti. Kontribusi gen-gen dalam sitoplasma terhadap penampilan ketiga sifat tersebut sangat kecil. Hal sama diperoleh oleh Pamandungan dan Bartholomeus (2018) untuk sifat komponen hasil (berat tongkol, panjang tongkol, diameter tongkol dan jumlah biji per tongkol).

### **KESIMPULAN**

Rata-rata sudut daun galur F1 hasil persilangan dan resiprok P8IS vs NK212 sama dengan kedua tua; sedangkan persilangan P8IS vs NK7328 berbeda. Resiprok persilangan nomor 13 (P8IS vs Nk7328 (R13)) memiliki sudut daun lebih kecil dibanding P8IS dan sama dengan sudut daun NK7328. Umur panen super genjah diperoleh pada hasil persilangan P8IS vNK212 nomor 1, 5, persilangan P8IS vs NK3728 nomor 11 dan 12. Daya hasil antargalur F1 kedua macam persilangan sama dengan masing-masing kedua tua; namun terjadi kecenderungan kenaikan daya hasil dibanding P8IS untuk sebagian besar galur F1. Terjadi perubahan sifat sudut daun, umur panen dan daya hasil galur F1 dibanding salah satu tua terbaik dengan nilai heterosis bersifat negatif dan positif dengan variasi dari 0.00 hingga 65.70 persen. Ketiga sifat pada kedua macam persilangan menunjukkan tidak ada efek maternal. Sudut daun yang lebih kecil, umur panen tetap super genjah dan daya hasil lebih tinggi, sangat dimungkinkan diperoleh pada galur-galur kedua macam persilangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrade F H, Calviño P, Cirilo A and Barbieri P. 2002. *Agron. J.* 94: 975-980.
- Abuali, A.I., A.A. Abdelmulla, M.M. Khalafalla, A.E. Idris and A.M. Osman. 2012. Combining ability and heterosis for yield and yield component in maize (*Zea mays* L.). *Aust. J. Basic Appl. Sci.* 6:36-41.
- Amzeri, A. 2015. Evaluasi Nilai Heterosis dan Heterobeltiosis Pada Persilangan Dialel Tanaman Jagung Madura (*Zea mays* L). *Agrosain* vol 3 (2):286-295.
- Anonymous. 2009. Metode Pembentukan Keragaman Genetik. <http://pttipb.wordpress.com/category/04-pembentukan-keragaman-genetik-dan-pengujiannya/41-metode-pembentukan-keragaman-genetik/> (Diakses, 19 Januari 2019).
- Badan Litbang Pertanian dan Balitsereal. 2015. Penggunaan Benih Jagung Umur Genjah Merupakan Upaya untuk Meminimalkan Kegagalan Panen. <http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/10038> (Diakses, 25 September 2019).
- Indriani, F.C. dan Mejaya. 2012. Toleransi Genotipe Jagung Biji Putih terhadap Cekaman Kekeringan. Hal. 411 – 420. *Prosiding Seminar Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- Iriany, R. N. , S. Sujiprihati, M. Syukur, J. Koswara, dan M. Yunus. 2011. Evaluasi Daya Gabung dan Heterosis Lima Galur Jagung Manis (*Zea mays* var. *saccharata*) Hasil Persilangan Diallel. *J. Agron. Indonesia* 39 (2): 103 – 111.
- Jaya, I K D., Sudirman and Sudika, I W. 2019. Light interception and yield of some maize varieties grown in a double row pattern under different urea applications. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 346: 1-6.
- Lupi, C. 1995. Genetic Engineering for Plant Protection Methods, State of the Art and Applications. [http://www.bats.ch/bats/publikationen/1995-1\\_TA/2-methods.php?lang\\_select=de](http://www.bats.ch/bats/publikationen/1995-1_TA/2-methods.php?lang_select=de) (Diakses, 19 Januari 2019).
- Pamandungan, Y. dan T. Bartholomeus O. 2018. Pewarisan Sifat Warna Dan Tipe Biji Jagung Manado Kuning. *Eugenia* vol 24 (1): 1-8.
- Setyowidianto, E.P., Basuki, N. dan Damanhuri. 2017. Daya Gabung dan Heterosis Galur Jagung (*Zea mays* L.) pada Karakter Hasil dan Komponen Hasil. *J. Agron. Indonesia* 45(2):124-129.
- Somantri A., Muhidin S.A. 2006. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sudika, I W., Arya Parwata dan Soemeinaboedhy. 2019a. Response seleksi massa dengan pengendalian dan tanpa pengendalian penyerbukan terhadap daya hasil tanaman jagung di lahan kering. *Prosiding Seminar Pertanian Ke-VI dan Lokakarya Nasional*. FKPTPI. Hal.: 31-41.
- Sudika, I W., Arya Parwata dan Soemeinaboedhy. 2019b. Seleksi Massa Guna Memperoleh Varietas Unggul Jagung Tahan Kering, Umur Panen Super Genjah, Hasil Dan Brangkasan Segar Tinggi. Laporan Hasil Penelitian (Tidak dipublikasi). Universitas Mataram, Mataram.
- Sudika, I W. 2016. Kajian potensi hasil, ketahanan cekaman kekeringan dan umur panen hasil Hibridisasi pada tanaman jagung (*Zea mays* L.) Di lahan kering. (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Suherman dan Awaludin. 2007. *Budidaya Jagung Manis (Zea Mays Saccharata Sturt)*, Bahan Kursus Budidaya Jagung Manis dan Jagung Merang, Fakultas Pertanian IPB. Bogor
- Syukur, M., S. Sastrosumarjo, Y. Wahyu, S.I. Aisyah, S. Sujiprihati, dan R. Yuniarti. 2015. *Sitogenetika Tanaman*. IPB Press. Bogor.
- Takdir, A.M., S. Sunarti dan M.J. Mejaya. 2010. Pembentukan Varietas Jagung Hibrida. Hal. 74 – 95. *Dalam Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan*. Litbang Deptan.